

考前 2 个月,汤以恒谈执业/助理医师如何快速提分 • TANG 题目汇总

1.判断早期成人股骨头缺血性坏死最敏感的无创检查是

- A.MRI
- B.血管造影
- C.B 超
- D.X 线片
- E.CT

2.男,72 岁,反酸,烧心 36 年。近日呼吸困难,乏力 2 个月。间断口服质子泵抑制剂治疗,起初有效,近 2 个月效果不佳。胃镜检查示食管下段及贲门区隆起溃疡性病变,质脆,易出血。最有可能的活组织检查为

- A.淋巴瘤
- B.神经内分泌肿瘤
- C.胃肠间质瘤
- D.鳞癌
- E.腺癌

3.对明确直肠癌局部浸润状况最有意义的检查是

- A.结肠镜
- B.全消化道 X 线钡剂造影
- C.结肠 X 线钡剂造影
- D.腹部 B 超
- E.盆腹部增强 CT

4.治疗肝性脑病时,可以促进氨代谢的药物是

- A.新霉素
- B.支链氨基酸
- C.乳果糖
- D.氟马西尼
- E.L-鸟氨酸-L-天冬氨酸

5.AIDS 患者病原体主要攻击

- A.单核细胞
- B.CD8+T 细胞
- C.粒细胞
- D.MK 细胞
- E.CD4+T 细胞

6.男,64 岁。上腹饱胀不适 4 个月,皮肤进行性黄染 3 个月。查体:皮肤、巩膜明显黄染。右上腹肋缘下可触及囊性包块,无触痛。为明确是否可行手术根治切除病灶,首选的检查是

- A.上消化道 X 线钡剂造影
- B.腹部 B 超
- C.PET-CT
- D.胃镜
- E.腹部 CT

7.能引起骨骼肌神经-肌接头处产生终板电位的神经递质是

- A.去甲肾上腺素
- B.乙酰胆碱
- C.谷氨酸
- D.多巴胺
- E.肾上腺素

8.男,25 岁。腹痛、脓血便、发热 2 个月。大便 10 次/日,体温 39℃。粪镜检及培养未见病原体。结肠镜检查示重度慢性炎症。左氧氟沙星联合甲硝唑治疗 1 周症状无缓解。最适宜的治疗药物是

- A.泼尼松
- B.柳氮磺吡啶
- C.硫唑嘌呤
- D.美沙拉嗪
- E.美沙拉嗪联合美沙拉嗪栓

9.男,64 岁。拟行胃癌根治术,平素吸烟 20 支/日。查体: T 37.5℃, P 90 次/分, BP 155/95mmHg。血 K⁺ 3.0mmol/L, Alb 35g/L。正确的术前准备是

- A.静脉补充人血白蛋白
- B.口服肠道抗生素
- C.术前 3 天戒烟
- D.补钾
- E.降低血压至正常

10.普洛萘尔的药理作用为

- A.松弛支气管平滑肌

- B.升高眼内压
- C.拮抗交感神经活性
- D.促进肾素释放
- E.促进血小板聚集

11.女, 出生 11 天。不能张口吸乳, 偶有咳嗽、蹙眉, 头后仰, 上肢屈曲, 下肢伸直, 手半握拳状, 无呼吸困难。其最可能的诊断是

- A.G+球菌感染
- B.G-球菌感染
- C.G+杆菌感染
- D.G-杆菌感染
- E.真菌感染

12.男, 56 岁。间断发热 1 个月, 进行性少尿、咯血 10 天, 查体: BP 165/100mmHg, 双肺听诊可闻及湿啰音, 双下肢水肿。尿常规: 蛋白(++)。尿沉渣镜检: RBC 40~50HP。血肌酐 455 $\mu\text{mol/L}$, 血尿素氮 18.5mmol/L, ANA (-), 抗中性粒细胞胞浆抗体 (+)。B 超示双肾增大。该患者肾脏最可能的病理特征是

- A.肾小球纤维化、玻璃样变
- B.肾小囊壁层上皮细胞增生
- C.弥漫性 GBM 增厚, 钉突形成
- D.系膜局灶性节段性增宽或弥漫性增宽
- E.系膜局灶性节段性硬化、玻璃样变

13.女, 28 岁。腹痛、发热、呕吐 1 天。查体: T 38.9°C, P 120 次/分, 律齐, 右下腹麦氏点压痛、反跳痛(+). 血常规: Hb 120g/L, WBC $10.2 \times 10^9/\text{L}$, N 0.85, PLT $202 \times 10^9/\text{L}$ 。行阑尾切除术, 手术标本病理检查可见阑尾壁各层大量弥漫性浸润的细胞是

- A.淋巴细胞
- B.巨噬细胞
- C.嗜碱性粒细胞
- D.嗜酸性粒细胞
- E.中性粒细胞

14.急性肾衰的鉴别首选

- A.同位素肾动态显像
- B.内生肌酐清除率

- E.尿钠排泄分数
- D.尿沉渣镜检
- E.肾脏 B 超

15.女, 63 岁, 夜尿增多伴血压升高 2 年, 乏力、纳差 1 个月, 既往间断服用“龙胆泻肝丸”多年, 查体: BP 150/95mmHg, 双下肢无水肿, 实验室检查: Hb 82g/L, Scr 238 $\mu\text{mol/L}$, Glu 5.4mmol/L, 尿常规: RBC (-), 蛋白 (+), 糖 (+)。放射性核素肾动态显像示左肾 GFR 10.2ml/min, 右肾 GFR 11.5ml/min。该患者的肾功能分期为

- A.慢性肾脏病 3 期
- B.慢性肾脏病 4 期
- C.慢性肾脏病 1 期
- D.慢性肾脏病 2 期
- E.慢性肾脏病 5 期

16.下列在系统性硬化中最具有标记性意义的抗体是

- A.抗 RNP
- B.抗 Jo-1
- C.抗 Scl-70
- D.抗 Sm
- E.抗双链 DNA

17.乳腺癌恶性程度最高的类型是

- A.浸润性导管癌
- B.浸润性小叶癌
- C.髓样癌
- D.炎性乳癌
- E.湿疹样癌

18.男, 28 岁。反复上腹痛 2 年, 以夜间及空腹痛为主, 加重并呕吐宿食 2 周, 伴口渴及少尿。该患者可能存在的电解质紊乱类型是

- A.低钙
- B.高钾高氯
- C.高钙
- D.高钠高氯
- E.低钾低氯

19.男, 46 岁。反复左腰部胀痛 6 个月, 疼

痛加重伴发热 1 周, 经抗炎治疗后症状无缓解。左腰部触痛明显。既往有左肾绞痛、血尿病史。血常规: WBC $11.2 \times 10^9/L$, N 0.80, 尿常规: WBC (++++)。B 超和 KUB 检查提示左输尿管上段结石, 长径 1.5cm, 平第 4 腰椎横突, 左肾重度积水。首选治疗方法是

- A. 输尿管切开取石
- B. 经皮肾镜碎石取石
- C. 体外冲击波碎石
- D. 肾穿刺造瘘
- E. 输尿管镜碎石取石

20. 男, 45 岁。地震中受挤压 10 小时后获救, 出现酱油色尿。查体: BP 105/60mmHg, 左下肢肿胀、压痛。尿隐血 (++++), 尿沉渣镜检 RBC 0~2/HP。Scr $280 \mu\text{mol/L}$, K⁺ 7.5mmol/L。首要的急救治疗是

- A. 大量补液
- B. 利尿
- C. 血液透析
- D. 抗感染
- E. 肿胀患肢切开减压

21. 以下疾病最常出现尿白细胞管型的是

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 微小病变型肾病
- C. IgA 肾病
- D. 急性肾小管坏死
- E. 急性肾小球肾炎

22. 男, 44 岁。平素体健。2 天前因四肢多发伤行手术治疗。4 小时前排柏油样便约 100g。粪隐血 (+)。最可能的诊断是

- A. 食管贲门黏膜撕裂综合征
- B. 反流性食管炎
- C. 胃癌
- D. 十二指肠溃疡
- E. 急性糜烂出血性胃炎

23. 系统性红斑狼疮患者的基础治疗药物是

- A. 硫酸羟氯喹
- B. 环磷酰胺
- C. 甲氨蝶呤

- D. 头抱曲松
- E. 扑尔敏

24. 女, 21 岁。左胫骨下段横形骨折, 经手法复位石膏固定后复查 X 线片, 符合功能复位的是

- A. 断端旋转 5°
- B. 断端重叠 2cm
- C. 骨折向外侧成角 5°
- D. 断端分离 1cm
- E. 骨折向前方成角 5°

25. 女, 42 岁。腰腿痛 2 个月。查体: 下腰椎旁压痛, 左下肢直腿抬高试验阳性 (50°), 加强试验阳性, 外踝及足背外侧皮肤感觉减弱, 踝反射消失, 考虑为腰椎间盘突出症, 最可能突出的间隙是

- A. L4-5
- B. L5-S1
- C. L2-3
- D. L1-2
- E. L3-4

26. 女, 22 岁。咽痛、发热伴咳嗽 2 周, 颜面水肿 3 天。查体: BP 150/100mmHg, 全身皮肤无皮疹。尿常规: 蛋白 (2+)。尿沉渣镜检: RBC 20~30/HP。血肌酐 $115 \mu\text{mol/L}$, 补体 C3 降低, ASO 升高。下列治疗不适宜的是

- A. 抗生素
- B. 休息
- C. 应用激素
- D. 利尿
- E. 控制血压

27. 类风湿关节炎的基本病理改变是

- A. 血管炎
- B. 滑膜炎
- C. 骨髓炎
- D. 肌腱鞘炎
- E. 软骨炎

28. 女, 56 岁, 间断水肿 8 年, 加重伴头痛、恶心 10 天, 查体: T 36.5°C , P 110 次/分,

BP 100/70mmHg, 贫血貌, 双中下肺可闻及湿啰音, 双下肢中度凹陷性水肿。尿常规: 蛋白(3+), 尿沉渣镜检 RBC 10~15/HP, 血红蛋白 68g/L, 血肌酐 892 $\mu\text{mol/L}$, 血钾 6.2mmol/L, 二氧化碳结合力 10mmol/L。该患者最重要的治疗为

- A. 降压
- B. 血液透析
- C. 碳酸氢钠
- D. 利尿
- E. 输血

29. 女, 22 岁, 妊娠 30 周。外阴灰白色疣状物伴瘙痒、灼痛不适半个月。外阴皮损病理组织学检查见挖空细胞。最可能的诊断

- A. 梅毒
- B. 尖锐湿疣
- C. 淋病
- D. 细菌性阴道炎
- E. 滴虫性阴道炎

30. 与急性梗阻性化脓性胆管炎实验室检查结果不符合的是

- A. 碱性磷酸酶升高
- B. 尿胆红素阳性
- C. 尿胆原升高
- D. 血清结合胆红素升高
- E. 白细胞计数升高

31. 女, 40 岁。双腕、双肘和足趾关节肿胀、疼痛 6 个月, 晨僵大于 1 小时, 活动后减轻。不伴发热、脱发、皮疹及光过敏等。实验室检查: 血沉 39mm/h, 抗环瓜氨酸肽抗体阳性。最可能的诊断是

- A. 骨关节炎
- B. 强直性脊柱炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 痛风关节炎
- E. 类风湿关节炎

32. 男, 22 岁, 乏力, 纳差 1 个月, 水肿少尿伴血尿升高 1 周, 尿蛋白(2+), 尿红细胞 30~50/HP, 血 Hb 76g/L, 补体 C3 正常, 肌酐 421 $\mu\text{mol/L}$ 。B 超提示双肾增大, 血清

抗肾小球基底膜抗体阳性, 最可能的诊断是

- A. 急进性肾小球肾炎 II 型
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. 急进性肾小球肾炎 III 型
- D. 急进性肾小球肾炎 I 型
- E. 急性肾小管坏死

33. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎的典型体征是

- A. Froment 征阳性
- B. 拇指对掌功能障碍
- C. 拇指感觉异常
- D. 垂腕
- E. Finkelstein 试验阳性

34. 子宫颈早期浸润癌浸润深度的标准是

- A. 不超过基底膜下 1mm
- B. 不超过基底膜下 5mm
- C. 不超过基底膜下 2mm
- D. 不超过基底膜下 3mm
- E. 不超过基底膜下 4mm

35. 属于胃十二指肠溃疡手术后早期并发症的是

- A. 术后胃瘫
- B. 营养性并发症
- C. 早期倾倒综合征
- D. 残胃癌
- E. 碱性反流性胃炎

36. 男, 35 岁。被倒塌的房屋压伤左下肢 6 小时入院。查体: T 37°C, P 108 次/分, R 28 次/分, 左小腿大片肌肉撕脱, 伤口处留有大量污物。急诊行清创处理, 术后 3 天, 患者体温逐步上升, 烦躁不安, 大量出汗, 尿量明显减少。观察伤口: 左下肢明显肿胀, 见大量恶臭浆液血性渗出物。皮下可触及捻发音。下列处理措施中, 不正确的是

- A. 整块切除受累肌肉
- B. 术后勤换敷料
- C. 应用高压氧治疗
- D. 首选氨基糖苷类抗生素
- E. 病变区多处切开

37. 女, 45 岁。1 年来久站或长时间行走时

觉左下腹部胀痛不适。查体: T 36.5°C, P 80 次分, R 8 次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹软, 无压痛, 立位左腹股沟韧带下方内侧突起半球形肿物, 平卧时可缩小, 咳嗽时无明显冲击感, 压迫内环后肿物仍可复出。该患者最适宜的手术方法是

- A.Shouldice 法疝修补术
- B.McVay 法疝修补术
- C.Bassini 法疝修补术
- D.Halsted 法疝修补术
- E.Ferguson 法疝修补术

(38~40 题共用题干)

女, 71 岁。3 小时前不慎摔伤左髌部。既往体健。查体: 左下肢缩短 2cm, 外旋 50° 畸形, 左髌部肿胀不明显, 轴向叩痛 (+)。

38.最可能的诊断是

- A.髌关节前脱位
- B.股骨颈骨折
- C.髌关节后脱位
- D.髌部软组织损伤
- E.股骨转子间骨折

39.为明确诊断首先要进行的检查是

- A.B 超
- B.MRI
- C.X 线片
- D.CT
- E.核素扫描

40.首选的治疗方式是

- A.左下肢骨牵引
- B.药物治疗
- C.左下肢皮牵引
- D.髌部石膏固定
- E.尽早手术治疗

(41~42 题共用题干)

女, 22 岁。右手及前臂沸水烫伤 1 小时。查体: 右手及前臂红肿明显, 有水泡, 部分水疱皮脱落, 可见创面红白相间, 疼痛迟钝。

41.理论上判断该患者烧伤面积占体表面积的百分比是

- A.5.5%
- B.4.5%
- C.3%
- D.6.5%
- E.11%

42.该患者烧伤深度及严重程度分度是

- A.深 II°, 中度烧伤
- B.浅 II°, 中度烧伤
- C.浅 II°, 轻度烧伤
- D.深 II°, 轻度烧伤
- E.深 II°, 重度烧伤

A.膀胱根治切除术

B.姑息性放疗

C.经尿道膀胱肿瘤电切术

D.膀胱部分切除术

E.经尿道膀胱肿瘤电切+膀胱灌注化疗

43.单发 Ta 期膀胱尿路上皮癌, 首选的治疗方法是

44.T3 期膀胱尿路上皮癌, 首选的治疗方法是

A.72 小时

B.24 小时

C.48 小时

D.10 小时

E.2 小时

45.急性胰腺炎时, 血淀粉酶升高达到高峰的时间一般是在发病后

46.急性胰腺炎时, 血脂肪酶开始升高的时间一般是在发病后

A.结肠脾曲

B.结肠肝曲

C.直肠和乙状结肠

D.回盲部

E.全结肠

47.肠结核的好发部位

48.溃疡性结肠炎的好发部位

A.纤维蛋白及血小板

B.血小板及粒细胞

C.纤维蛋白及淋巴细胞

D.纤维蛋白及粒细胞

E.纤维蛋白及红细胞

49.血栓头部的主要成分是

50.血栓尾部的主要成分是



1.判断早期成人股骨头缺血性坏死最敏感的无创检查是

A.MRI

B.血管造影

C.B 超

D.X 线片

E.CT

【答案】A

2.男, 72 岁, 反酸, 烧心 36 年。近日呼吸困难, 乏力 2 个月。间断口服质子泵抑制剂治疗, 起初有效, 近 2 个月效果不佳。胃镜检查示食管下段及贲门区隆起溃疡性病变, 质脆, 易出血。最有可能的活组织检查为

A.淋巴瘤

B.神经内分泌肿瘤

C.胃肠间质瘤

D.鳞癌

E.腺癌

【答案】E, 胃食管反流病——Barrett 食管——腺癌。

3.对明确直肠癌局部浸润状况最有意义的检查是

A.结肠镜

B.全消化道 X 线钡剂造影

C.结肠 X 线钡剂造影

D.腹部 B 超

E.盆腹部增强 CT

【答案】E, 另有——直肠腔内超声。

4.治疗肝性脑病时, 可以促进氨代谢的药物是

A.新霉素

B.支链氨基酸

C.乳果糖

D.氟马西尼

E.L-鸟氨酸-L-天冬氨酸

【答案】E

5.AIDS 患者病原体主要攻击

A.单核细胞

B.CD8+T 细胞

C.粒细胞

D.MK 细胞

E.CD4+T 细胞

【答案】E

6.男, 64 岁。上腹饱胀不适 4 个月, 皮肤进行性黄染 3 个月。查体: 皮肤、巩膜明显黄染。右上腹肋缘下可触及囊性包块, 无触痛。为明确是否可行手术根治切除病灶, 首选的检查是

A.上消化道 X 线钡剂造影

B.腹部 B 超

C.PET-CT

D.胃镜

E.腹部 CT

【答案】E, 判断胰头癌是否侵犯大血管——CT。

7.能引起骨骼肌神经-肌接头处产生终板电位的神经递质是

A.去甲肾上腺素

B.乙酰胆碱

C.谷氨酸

D.多巴胺

E.肾上腺素

【答案】B

8.男, 25 岁。腹痛、脓血便、发热 2 个月。大便 10 次/日, 体温 39℃。粪镜检及培养未见病原体。结肠镜检查示重度慢性炎症。左氧氟沙星联合甲硝唑治疗 1 周症状无缓解。最适宜的治疗药物是

A.泼尼松

B.柳氮磺吡啶

C.硫唑嘌呤

D.美沙拉嗪

E.美沙拉嗪联合美沙拉嗪栓

【答案】A

9.男, 64 岁。拟行胃癌根治术, 平素吸烟 20 支/日。查体: T 37.5℃, P 90 次/分, BP

155/95mmHg。血 K⁺ 3.0mmol/L, Alb 35g/L。

正确的术前准备是

- A. 静脉补充人血白蛋白
- B. 口服肠道抗生素
- C. 术前 3 天戒烟
- D. 补钾
- E. 降低血压至正常

【答案】D

10. 普洛萘尔的药理作用为

- A. 松弛支气管平滑肌
- B. 升高眼内压
- C. 拮抗交感神经活性
- D. 促进肾素释放
- E. 促进血小板聚集

【答案】C

11. 女, 出生 11 天。不能张口吸乳, 偶有咳嗽、蹙眉, 头后仰, 上肢屈曲, 下肢伸直, 手握拳状, 无呼吸困难。其最可能的诊断是

- A. G⁺ 球菌感染
- B. G⁻ 球菌感染
- C. G⁺ 杆菌感染
- D. G⁻ 杆菌感染
- E. 真菌感染

【答案】C

12. 男, 56 岁。间断发热 1 个月, 进行性少尿、咯血 10 天, 查体: BP 165/100mmHg, 双肺听诊可闻及湿啰音, 双下肢水肿。尿常规: 蛋白(++)。尿沉渣镜检: RBC 40~50HP。血肌酐 455 μmol/L, 血尿素氮 18.5mmol/L, ANA (-), 抗中性粒细胞胞浆抗体 (+)。B 超示双肾增大。该患者肾脏最可能的病理特征是

- A. 肾小球纤维化、玻璃样变
- B. 肾小囊壁层上皮细胞增生
- C. 弥漫性 GBM 增厚, 钉突形成
- D. 系膜局灶性节段性增宽或弥漫性增宽
- E. 系膜局灶性节段性硬化、玻璃样变

【答案】B

13. 女, 28 岁。腹痛、发热、呕吐 1 天。查

体: T 38.9℃, P 120 次/分, 律齐, 右下腹麦氏点压痛、反跳痛(+). 血常规: Hb 120g/L, WBC 10.2×10⁹/L, N 0.85, PLT 202×10⁹/L。行阑尾切除术, 手术标本病理检查可见阑尾壁各层大量弥漫性浸润的细胞是

- A. 淋巴细胞
- B. 巨噬细胞
- C. 嗜碱性粒细胞
- D. 嗜酸性粒细胞
- E. 中性粒细胞

【答案】E, 会啥, 不考啥。

14. 急慢性肾衰的鉴别首选

- A. 同位素肾动态显像
- B. 内生肌酐清除率
- C. 尿钠排泄分数
- D. 尿沉渣镜检
- E. 肾脏 B 超

【答案】E, 急性——大; 慢性——小。

15. 女, 63 岁, 夜尿增多伴血压升高 2 年, 乏力、纳差 1 个月, 既往间断服用“龙胆泻肝丸”多年, 查体: BP 150/95mmHg; 双下肢无水肿, 实验室检查: Hb 82g/L, Scr 238 μmol/L, Glu 5.4mmol/L, 尿常规: RBC (-), 蛋白(+), 糖(+). 放射性核素肾动态显像示左肾 GFR 10.2ml/min, 右肾 GFR 11.5ml/min。该患者的肾功能分期为

- A. 慢性肾脏病 3 期
- B. 慢性肾脏病 4 期
- C. 慢性肾脏病 1 期
- D. 慢性肾脏病 2 期
- E. 慢性肾脏病 5 期

【答案】B, 注意! 不选 E, GFR 需双侧相加。

16. 下列在系统性硬化中最具有标记性意义的抗体是

- A. 抗 RNP
- B. 抗 Jo-1
- C. 抗 Scl-70
- D. 抗 Sm
- E. 抗双链 DNA

【答案】C——不是 SLE, 眼神儿啊眼神儿。

17. 乳腺癌恶性程度最高的类型是

- A. 浸润性导管癌

- B.浸润性小叶癌
- C.髓样癌
- D.炎性乳癌
- E.湿疹样癌

【答案】D

18.男, 28 岁。反复上腹痛 2 年, 以夜间及空腹痛为主, 加重并呕吐宿食 2 周, 伴口渴及少尿。该患者可能存在的电解质紊乱类型是

- A.低钙
- B.高钾高氯
- C.高钙
- D.高钠高氯
- E.低钾低氯

【答案】E

19.男, 46 岁。反复左腰部胀痛 6 个月, 疼痛加重伴发热 1 周, 经抗炎治疗后症状无缓解。左腰部触痛明显。既往有左肾绞痛、血尿病史。血常规: WBC $11.2 \times 10^9/L$, N 0.80, 尿常规: WBC (++++), B 超和 KUB 检查提示左输尿管上段结石, 长径 1.5cm, 平第 4 腰椎横突, 左肾重度积水。首选治疗方法是

- A.输尿管切开取石
- B.经皮肾镜碎石取石
- C.体外冲击波碎石
- D.肾穿刺造瘘
- E.输尿管镜碎石取石

【答案】D。助理题, 但有难度。易错答案——C。重度积水——先造瘘。

20.男, 45 岁。地震中受挤压 10 小时后获救, 出现酱油色尿。查体: BP 105/60mmHg, 左下肢肿胀、压痛。尿隐血 (++++), 尿沉渣镜检 RBC 0~2/HP。Scr $280 \mu\text{mol/L}$, K⁺ 7.5mmol/L。首要的急救治疗是

- A.大量补液
- B.利尿
- C.血液透析
- D.抗感染
- E.肿胀患肢切开减压

【答案】E, 易错答案——C。此外, 该患者属挤压综合征——大量肌红蛋白涌入肾脏——酱油色尿 (血尿+溢出性蛋白尿)。

21.以下疾病最常出现尿白细胞管型的是

- A.急性肾盂肾炎
- B.微小病变型肾病
- C.IgA 肾病
- D.急性肾小管坏死
- E.急性肾小球肾炎

【答案】A

22.男, 44 岁。平素体健。2 天前因四肢多发伤行手术治疗。4 小时前排柏油样便约 100g。粪隐血 (+)。最可能的诊断是

- A.食管贲门黏膜撕裂综合征
- B.反流性食管炎
- C.胃癌
- D.十二指肠溃疡
- E.急性糜烂出血性胃炎

【答案】E, 手术后引起的应激性溃疡出血。

23.系统性红斑狼疮患者的基础治疗药物是

- A.硫酸羟氯喹
- B.环磷酰胺
- C.甲氨蝶呤
- D.头孢曲松
- E.扑尔敏

【答案】A

24.女, 21 岁。左胫骨下段横形骨折, 经手法复位石膏固定后复查 X 线片, 符合功能复位的是

- A.断端旋转 5°
- B.断端重叠 2cm
- C.骨折向外侧成角 5°
- D.断端分离 1cm
- E.骨折向前方成角 5°

【答案】E

25.女, 42 岁。腰腿痛 2 个月。查体: 下腰椎旁压痛, 左下肢直腿抬高试验阳性 (50°), 加强试验阳性, 外踝及足背外侧皮肤感觉减弱, 踝反射消失, 考虑为腰椎间盘突出症, 最可能突出的间隙是

- A.L4-5
- B.L5-S1
- C.L2-3

D.L1-2

E.L3-4

【答案】 B

26.女, 22 岁。咽痛、发热伴咳嗽 2 周, 颜面水肿 3 天。查体: BP 150/100mmHg, 全身皮肤无皮疹。尿常规: 蛋白(2+)。尿沉渣镜检: RBC 20-30/HP。血肌酐 $115 \mu\text{mol/L}$, 补体 C3 降低, ASO 升高。下列治疗不适宜的是

- A. 抗生素
- B. 休息
- C. 应用激素
- D. 利尿
- E. 控制血压

【答案】 C

27. 类风湿关节炎的基本病理改变是

- A. 血管炎
- B. 滑膜炎
- C. 骨髓炎
- D. 肌腱鞘炎
- E. 软骨炎

【答案】 B

28. 女, 56 岁, 间断水肿 8 年, 加重伴头痛、恶心 10 天, 查体: T 36.5°C , P 110 次/分, BP 100/70mmHg, 贫血貌, 双中下肺可闻及湿啰音, 双下肢中度凹陷性水肿。尿常规: 蛋白(3+), 尿沉渣镜检 RBC $10 \sim 15/\text{HP}$, 血红蛋白 68g/L , 血肌酐 $892 \mu\text{mol/L}$, 血钾 6.2mmol/L , 二氧化碳结合力 10mmol/L 。该患者最重要的治疗为

- A. 降压
- B. 血液透析
- C. 碳酸氢钠
- D. 利尿
- E. 输血

【答案】 B

29. 女, 22 岁, 妊娠 30 周。外阴灰白色疣状物伴瘙痒、灼痛不适半个月。外阴皮损病理组织学检查见挖空细胞。最可能的诊断

- A. 梅毒
- B. 尖锐湿疣
- C. 淋病
- D. 细菌性阴道炎
- E. 滴虫性阴道炎

【答案】 B

30. 与急性梗阻性化脓性胆管炎实验室检查结果不符合的是

- A. 碱性磷酸酶升高
- B. 尿胆红素阳性
- C. 尿胆原升高
- D. 血清结合胆红素升高
- E. 白细胞计数升高

【答案】 C

31. 女, 40 岁。双腕、双肘和足趾关节肿胀、疼痛 6 个月, 晨僵大于 1 小时, 活动后减轻。不伴发热、脱发、皮疹及光过敏等。实验室检查: 血沉 39mm/h , 抗环瓜氨酸肽抗体阳性。最可能的诊断是

- A. 骨关节炎
- B. 强直性脊柱炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 痛风关节炎
- E. 类风湿关节炎

【答案】 E

32. 男, 22 岁, 乏力, 纳差 1 个月, 水肿少尿伴血尿升高 1 周, 尿蛋白(2+), 尿红细胞 $30 \sim 50/\text{HP}$, 血 Hb 76g/L , 补体 C3 正常, 肌酐 $421 \mu\text{mol/L}$ 。B 超提示双肾增大, 血清抗肾小球基底膜抗体阳性, 最可能的诊断是

- A. 急进性肾小球肾炎 II 型
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. 急进性肾小球肾炎 III 型
- D. 急进性肾小球肾炎 I 型
- E. 急性肾小管坏死

【答案】 D, 一打基础, 二人复合, 三中全会 TANG。

33. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎的典型体征是

- A. Froment 征阳性
- B. 拇指对掌功能障碍
- C. 拇指感觉异常
- D. 垂腕
- E. Finkelstein 试验阳性

【答案】 E

34. 子宫颈早期浸润癌浸润深度的标准是

- A. 不超过基底膜下 1mm
- B. 不超过基底膜下 5mm
- C. 不超过基底膜下 2mm
- D. 不超过基底膜下 3mm
- E. 不超过基底膜下 4mm

【答案】B

35. 属于胃十二指肠溃疡手术后早期并发症的是

- A. 术后胃瘫
- B. 营养性并发症
- C. 早期倾倒综合征
- D. 残胃癌
- E. 碱性反流性胃炎

【答案】A

36. 男, 35 岁。被倒塌的房屋压伤左下肢 6 小时入院。查体: T 37°C, P 108 次/分, R 28 次/分, 左小腿大片肌肉撕脱, 伤口处留有大量污物。急诊行清创处理, 术后 3 天, 患者体温逐步上升, 烦躁不安, 大量出汗, 尿量明显减少。观察伤口: 左下肢明显肿胀, 见大量恶臭浆液血性渗出物。皮下可触及捻发音。下列处理措施中, 不正确的是

- A. 整块切除受累肌肉
- B. 术后勤换敷料
- C. 应用高压氧治疗
- D. 首选氨基糖苷类抗生素
- E. 病变区多处切开

【答案】D, 首选青霉素。

37. 女, 45 岁。1 年来久站或长时间行走时觉左下腹部胀痛不适。查体: T 36.5°C, P 80 次/分, R 8 次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹软, 无压痛, 立位左腹股沟韧带下方内侧突起半球形肿物, 平卧时可缩小, 咳嗽时无明显冲击感, 压迫内环后肿物仍可复出。该患者最适宜的手术方法是

- A. Shouldice 法疝修补术
- B. McVay 法疝修补术
- C. Bassini 法疝修补术
- D. Halsted 法疝修补术
- E. Ferguson 法疝修补术

【答案】B

(38~40 题共用题干)

女, 71 岁。3 小时前不慎摔伤左髌部。既往体健。查体: 左下肢缩短 2cm, 外旋 50° 畸形, 左髌部肿胀不明显, 轴向叩痛 (+)。

38. 最可能的诊断是

- A. 髌关节前脱位
- B. 股骨颈骨折
- C. 髌关节后脱位
- D. 髌部软组织损伤
- E. 股骨转子间骨折

【答案】B

39. 为明确诊断首先要进行的检查是

- A. B 超
- B. MRI
- C. X 线片
- D. CT
- E. 核素扫描

【答案】C

40. 首选的治疗方式是

- A. 左下肢骨牵引
- B. 药物治疗
- C. 左下肢皮牵引
- D. 髌部石膏固定
- E. 尽早手术治疗

【答案】E, 老年人股骨颈骨折, 为避免卧床的并发症, 应早期手术。

(41~42 题共用题干)

女, 22 岁。右手及前臂沸水烫伤 1 小时。查体: 右手及前臂红肿明显, 有水泡, 部分水疱皮脱落, 可见创面红白相间, 疼痛迟钝。

41. 理论上判断该患者烧伤面积占体表面积的百分比是

- A. 5.5%
- B. 4.5%
- C. 3%
- D. 6.5%
- E. 11%

【答案】A, $(5+6)/2$, 深 II°。

42. 该患者烧伤深度及严重程度分度是

- A. 深 II°, 中度烧伤
- B. 浅 II°, 中度烧伤
- C. 浅 II°, 轻度烧伤

D.深Ⅱ°，轻度烧伤

E.深Ⅱ°，重度烧伤

【答案】D

A.膀胱根治切除术

B.姑息性放疗

C.经尿道膀胱肿瘤电切术

D.膀胱部分切除术

E.经尿道膀胱肿瘤电切+膀胱灌注化疗

43.单发 Ta 期膀胱尿路上皮癌，首选的治疗方法是

44.T3 期膀胱尿路上皮癌，首选的治疗方法是

【答案】C; A

A.72 小时

B.24 小时

C.48 小时

D.10 小时

E.2 小时

45.急性胰腺炎时，血淀粉酶升高达到高峰的时间一般是在发病后

46.急性胰腺炎时，血脂肪酶开始升高的时间一般是在发病后

【答案】B; B

A.结肠脾曲

B.结肠肝曲

C.直肠和乙状结肠

D.回盲部

E.全结肠

47.肠结核的好发部位

48.溃疡性结肠炎的好发部位

【答案】D; C

A.纤维蛋白及血小板

B.血小板及粒细胞

C.纤维蛋白及淋巴细胞

D.纤维蛋白及粒细胞

E.纤维蛋白及红细胞

49.血栓头部的主要成分是

50.血栓尾部的主要成分是

【答案】A; E，白头到老，猴屁股——红。

TANG

