

医学教育网内科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第28期

问题索引:

1. 对慢性胰腺炎和胰腺癌的鉴别有重要价值的检查是什么?
2. 肝性脑病时应用抗生素的主要目的是什么?
3. 肝硬化腹水少尿时首选哪种利尿剂?

具体解答:

1. 对慢性胰腺炎和胰腺癌的鉴别有重要价值的检查是什么?

对慢性胰腺炎和胰腺癌的鉴别有重要价值的检查是

- A. 经腹壁超声检查
- B. 超声内镜引导下细针穿刺
- C. 糖抗原 CA19-9
- D. 腹部加强 CT
- E. 腹部核磁共振

【正确答案】 B

【答案解析】 慢性胰腺炎与胰腺癌的鉴别在临床上有很大困难,有些慢性胰腺炎可出现炎性包块,胰腺癌亦可表现为弥漫浸润型,穿刺病理为鉴别两者最有价值的参考指标,但穿刺病理阴性,也不能完全除外胰腺癌。[医学教育网原创]

2. 肝性脑病时应用抗生素的主要目的是什么?

肝性脑病时应用抗生素的主要目的是

- A. 抑制肠道细菌,减少氨的形成
- B. 减少真菌繁殖
- C. 预防原发性腹膜炎
- D. 预防继发性肠道感染
- E. 清除肠道毒素

【正确答案】 A

【答案解析】 肝性脑病治疗原则中减少肠内毒物的生成和吸收。其中就提到抑制细菌生长:如口服新霉素、氨苄西林、乳果糖等可减少氨的形成和吸收。

3. 肝硬化腹水少尿时首选哪种利尿剂?

肝硬化腹水少尿时首选哪种利尿剂

- A. 螺内酯+呋塞米
- B. 呋塞米
- C. 氨苯蝶啶
- D. 氢氯噻嗪
- E. 呋塞米+双氢克尿噻

【正确答案】 A

【答案解析】 临床常用的利尿剂为螺内酯和呋塞米。前者为潴钾利尿剂，单独长期大量使用可发生高钾血症；后者为排钾利尿剂，单独应用应同时补钾。腹水患者中有明显的电解质紊乱，容易因利尿剂的应用而发生肝性脑病，所以不宜单独使用强烈的排钾利尿剂，应联合用药。既可加强疗效，又可减少不良反应。故选 A。[医学教育网原创]