

内科主治医师《基础知识》模考试卷

一、A1

1. Courvoisier 征指

- A. 胆囊触痛，深吸气时患者感觉疼痛并终止吸气
- B. 见于胆囊炎，而胆囊无肿大
- C. 梗阻性黄疸伴无痛性胆囊肿大
- D. 阑尾炎时，右下腹压痛阳性
- E. 上输尿管压痛点阳性

2. 叩诊呈过清音的是

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 肺气肿
- C. 心包积液
- D. 肺结核
- E. 气胸

3. 大量心包积液的体征不包括

- A. 颈静脉怒张
- B. 心率增快
- C. Ewart 征
- D. 肝大
- E. 脉压增大

4. 大叶性肺炎患者如能听到胸膜摩擦音，该摩擦音的特点为

- A. 呼气初明显
- B. 吸气初明显
- C. 仅能在吸气时听到
- D. 与心搏一致
- E. 屏气时不消失

5. 关于颈部浅表淋巴结触诊，哪项是错误的
- A. 一般顺序：耳前、耳后、乳突区、枕骨下区、颈后三角、颈前三角
 - B. 检查者应站在其右侧
 - C. 患者头稍低，略偏向被检查侧
 - D. 淋巴结触诊仅对浅表淋巴结有意义
 - E. 检查者按一定顺序，由浅入深，滑动触诊
6. 下列疾病为血管壁功能异常引起的是
- A. 血友病
 - B. 特发性血小板减少性紫癜
 - C. 过敏性紫癜
 - D. 血友病
 - E. 严重肝病
7. 下列哪一项为血小板功能异常引起的疾病
- A. 血小板无力症
 - B. 药物性紫癜
 - C. 过敏性紫癜
 - D. 机械性紫癜
 - E. 血友病
8. 慢性肾功能不全时代谢性酸中毒的原因不包括
- A. 水、钠潴留
 - B. 酸性代谢产物潴留
 - C. 肾小管重吸收碳酸氢盐能力下降
 - D. 肾小管制造氨的能力下降
 - E. 肾小管泌氢功能受损

9. 在我国，心脏瓣膜病最常见原因是以下哪项

- A. 退行性改变
- B. 风湿热
- C. 先天性畸形
- D. 缺血性坏死
- E. 创伤

10. 我国肝硬化发生的最常见原因是

- A. 慢性酒精性肝病
- B. 病毒性肝炎
- C. 自身免疫性肝炎
- D. 长期胆汁淤积
- E. 药物或毒物

11. 消化性溃疡发病机制的描述，不正确的是

- A. 溃疡的形成有胃酸-胃蛋白酶的消化作用参与
- B. 十二指肠溃疡患者晚间胃酸分泌相对增加
- C. Hp 是消化性溃疡的主要原因
- D. 胃酸在胃溃疡发病中的作用可忽略不计
- E. 在十二指肠溃疡发病中黏膜防卫力量削弱较胃酸增高更重要

12. 高钾血症的原因不包括

- A. 静脉补钾过快
- B. 急性肾功能衰竭
- C. 输入大量库存血
- D. 持续胃肠减压
- E. 洋地黄中毒

13. 属于急性白血病髓细胞微分化型的是

- A. M_0
- B. M_1
- C. M_2
- D. M_3
- E. M_4

14. 阿司匹林发挥作用，抑制的酶是

- A. 磷脂酶 A
- B. 二氢叶酸合成酶
- C. 环加氧酶
- D. 过氧化物酶
- E. 胆碱酯酶

15. G6PD 缺乏症的发病机制为

- A. 红细胞膜异常
- B. 遗传性红细胞酶缺乏
- C. 遗传性珠蛋白生成障碍
- D. 血红蛋白异常
- E. 免疫介导

16. 以下哪种药物不会导致急性胰腺炎

- A. 硫唑嘌呤
- B. 塞来昔布
- C. 避孕药
- D. 糖皮质激素
- E. 红霉素

17. 下列有关体温的生理变异，错误的是

- A. 运动时体温可暂时升高

- B. 女子基础体温排卵之日最高
- C. 清晨 2~6 时最低，下午 1~6 时最高
- D. 新生儿体温易波动，老年则略有下降
- E. 儿童略高于成人，女子略高于男子

18. 不是血管性舒缩障碍引起的晕厥

- A. 排尿性晕厥
- B. 咳嗽性晕厥
- C. 颈动脉窦综合征
- D. 阿斯综合征
- E. 体位性低血压

19. 瞳孔缩小见于

- A. 视神经萎缩
- B. 阿托品药物中毒
- C. 深昏迷患者
- D. 吗啡中毒
- E. 颅内病变

20. 关于肋骨的描述，正确的是

- A. 第 11~12 肋骨不与胸骨相连，其前端为游离缘，称为浮肋
- B. 左、右各 12 对
- C. 第 8~10 肋骨为浮肋
- D. 第 8~10 肋骨不通过肋软骨直接与胸骨连接
- E. 所有肋骨背部与相应的胸椎相连，前胸与胸骨相连

21. 大叶性肺炎常见的热型是

- A. 稽留热
- B. 弛张热

- C. 间歇热
- D. 波状热
- E. 不规则热

22. 血尿尿三杯试验如第一杯为血尿，应考虑病变部位在

- A. 前尿道
- B. 输尿管
- C. 肾盂
- D. 膀胱三角区
- E. 后尿道

23. 不属于中枢性呕吐的是

- A. 脑膜炎
- B. 尿毒症
- C. 青光眼
- D. 高血压脑病
- E. 癫痫

24. 最灵敏的检查腹部少量腹水的体位是

- A. 平卧屈膝位
- B. 右侧卧位
- C. 左侧卧位
- D. 肘膝位
- E. 半卧位

25. 肾小管液中的氨基酸被重吸收的部位主要在

- A. 近曲小管
- B. 髓祥细段
- C. 集合管

D. 远曲小管

E. 髓袢升支粗段

26. 中至大量胸腔积液时，下列哪项体征是错误的

A. 语颤减弱

B. 患侧呼吸音减弱

C. 胸廓饱满，肋间隙增宽

D. 患侧叩诊浊音

E. 语颤增强

27. 急性持续性腹痛，阵发性加剧并伴休克，最大可能是

A. 输尿管结石肾绞痛

B. 绞窄性肠梗阻

C. 溃疡病急性发作

D. 急性阑尾炎

E. 急性胆囊炎

28. 在 pH 5.5 时，杀菌效果最好的结核药物是

A. 利福平

B. 吡嗪酰胺

C. 异烟肼

D. 利福喷丁

E. 链霉素

29. 口腔黏膜出现蓝黑色色素沉着多见于

A. 库欣综合症

B. 出血性疾病

C. 系统性红斑狼疮

D. 麻疹

E. Addison 病

30. 鉴别肝内胆汁淤积性黄疸与肝外梗阻性黄疸最确切的方法是

- A. 肝功能试验
- B. 超声显象
- C. 静脉胆道造影
- D. ERCP
- E. PTC

31. 亚硝酸盐中毒的解毒药是

- A. 依地酸二钠钙
- B. 亚甲蓝
- C. 二巯基丁二酸
- D. 氯解磷定
- E. 纳洛酮

32. 下列哪项有利于室性心动过速与室上性心动过速的鉴别

- A. 心室率 160 次/分
- B. 心电图 QRS 波宽大畸形
- C. 过去发现室性期前收缩
- D. 心脏增大
- E. 心电图有心室夺获及室性融合波

33. 系统性红斑狼疮最常见的心血管损害是

- A. 心包炎
- B. 心内膜炎
- C. 心肌炎
- D. 心瓣膜病变
- E. 闭塞性脉管炎

34. 肝硬化患者 Child-Pugh 分级标准中不包括哪一项指标

- A. 腹水
- B. 凝血酶原时间
- C. 总胆红素
- D. 转氨酶
- E. 白蛋白

35. 白血病化疗期间口服别嘌醇的目的是

- A. 抑制尿酸的合成
- B. 加强尿素的合成
- C. 加强化疗药物的疗效
- D. 加强尿酸的排泄
- E. 抑制尿素的排泄

36. 癌前病变是指

- A. 一类恶性病变
- B. 癌变早期
- C. 一类必然癌变的病变
- D. 交界性肿瘤
- E. 有明显癌变危险的一类良性病变

37. 慢性粒细胞白血病首选治疗药物是

- A. 羟基脲
- B. 白消安（马利兰）
- C. 靛玉红
- D. α -干扰素
- E. 阿糖胞苷

38. 慢性肺源性心脏病最常见的病因是

- A. 肺结核
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管扩张
- D. 慢性支气管炎
- E. 原发性肺动脉高压症

39. 慢性心脏病患者，心衰诱因中最常见的是

- A. 不恰当停用洋地黄
- B. 妊娠
- C. 肺部感染
- D. 情绪波动
- E. 心律失常

40. 关于浸润性突眼的特点，下列哪一项不正确

- A. 浸润性突眼与甲状腺毒症所致的交感神经兴奋性增高有关
- B. 浸润性突眼与眶后组织的自身免疫炎症有关
- C. 浸润性突眼的突眼度一般超过 18mm
- D. 严重的浸润性突眼可导致失明
- E. 手术和 ^{131}I 治疗甲亢时可能加重浸润性突眼

41. 以下哪种疾病腹部压痛部位不固定

- A. 小肠克罗恩病
- B. 溃疡性结肠炎，全结肠型
- C. 结核性腹膜炎
- D. 肠易激综合征
- E. 恶性肿瘤腹膜广泛转移

42. 蜘蛛痣不常见的部位是

- A. 面部
- B. 颈部
- C. 肩部
- D. 手臂
- E. 脚背

43. 鉴别血尿与血红蛋白尿的主要手段是

- A. 尿潜血检查
- B. 尿三杯试验
- C. 尿胆原
- D. 血尿颜色
- E. 尿沉渣检查

44. 颈外静脉怒张伴收缩期搏动见于

- A. 三尖瓣关闭不全
- B. 三尖瓣狭窄
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣关闭不全

45. 内脏性腹痛的特点不正确的是

- A. 部位不确定，接近腹中线
- B. 疼痛感觉模糊，多为痉挛、不适等
- C. 一般没有局部腹肌强直
- D. 常伴有恶心、呕吐、出汗等
- E. 可因咳嗽、体位变化而加重

46. 不属于胃黏膜保护剂的是

- A. 胃蛋白酶

B. 硫糖铝

C. 枸橼酸铋钾

D. 米索前列醇

E. 替普瑞酮

47. 关于体表肿瘤的说法，正确的是

A. 皮脂腺囊肿常发生在耳后或面部，因为感染可导致其迅速增大

B. 脂肪瘤好发于头面部

C. 表皮样囊肿多发生于躯干

D. 皮肤癌对放疗不敏感

E. 海绵状血管瘤最好用放疗治疗

48. 帕金森病常见的病理步态是

A. 醉酒步态

B. 跨阈步态

C. 剪刀步态

D. 前冲步态

E. 肌病步态

49. 周围性眩晕最有可能出现的临床表现是

A. 前庭功能异常，听力减退，发作时有水平方向眼球震颤

B. 前庭功能正常，听力严重减退，发作时眼球垂直震颤

C. 前庭功能正常，听力基本正常，持续眼球震颤阳性

D. 前庭功能异常，听力正常，发作时眼球垂直震颤

E. 前庭功能变化不定，听力基本消失，发作时眼球垂直震颤

50. 下列疾病中 HLA-B27 阳性率最高的是

A. 溃疡性结肠炎

B. 银屑病

- C. 强直性脊柱炎
- D. 类风湿关节炎
- E. 系统性红斑狼疮

二、A2

51. 糖尿病酮症酸中毒患者经胰岛素、输液补碱等治疗后，血糖降为 6.7mmol/L， CO_2CP 为 18mmol/L，但昏迷反而加重且出现抽搐，球结膜水肿，可疑的原因是

- A. 离子紊乱
- B. 脑水肿
- C. 肾衰竭
- D. 低血糖
- E. 以上都不是

52. 女性，36 岁。情绪激动后突然出现剧烈头痛，并呕吐 2 次，2 小时后来院急诊。平时身体健康，无高血压病史。体检最可能发现的是

- A. 偏瘫
- B. 偏身感觉障碍
- C. 失语
- D. 动眼神经瘫痪
- E. 脑膜刺激征

53. 男性，36 岁。上呼吸道感染后发现尿中泡沫增多 4 个月。查体：颜面、眼睑、双下肢无水肿，BP 120/75mmHg，多次 24 小时尿蛋白定量 0.76~0.92g，尿蛋白圆盘电泳以中分子带为主，肌酐、尿素氮均正常，诊断为隐匿性肾炎。

蛋白尿应是

- A. 分泌性蛋白尿
- B. 肾小球性蛋白尿
- C. 肾小管性蛋白尿
- D. 组织性蛋白尿

E. 溢出性蛋白尿

54. 女性，39岁。以突发右侧腰痛1周，寒战、高热1天入院。尿白细胞（++），尿培养有大肠埃希菌生长，静脉肾盂造影示右侧膀胱输尿管反流。其感染途径最可能为

- A. 直接感染
- B. 淋巴管感染
- C. 上行感染
- D. 血行感染
- E. 以上均不是

55. 男性，72岁。反复尿频、尿不尽感、排尿困难10年，发热伴腰痛5天，1周前因尿潴留曾行导尿术，尿常规白细胞78个/HP，红细胞2~4个/HP，诊断为前列腺肥大并急性肾盂肾炎。临床选用抗生素应注意针对的病原微生物是

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. L型细菌
- D. 结核杆菌
- E. 真菌

56. 女性，45岁。慢性腹泻20年，排便3~5次/天，便稀，便前腹痛，排便后缓解。诊断为肠易激综合征。以下不是肠易激综合征表现的是

- A. 很少影响食欲
- B. 出现睡眠后疼痛
- C. 腹痛常发生于餐后或排便前
- D. 餐后腹痛者排便后可缓解
- E. 当处于应激或情绪紧张时可促发或加重症状

57. 男性，56岁。肝硬化病史4年，消化性溃疡病史15年，因1小时前突然呕血约1200ml来诊。查体：心率120次/分，血压80/40mmHg。患者出血的病因应首先考虑为

- A. 食管静脉曲张破裂出血
- B. 消化性溃疡
- C. 门脉高压性胃病
- D. 急性胃黏膜病变
- E. 食管贲门黏膜撕裂综合征

58. 患者，女性，88岁，既往体健。现腹泻2个月，便常规结果为黏液脓血便，WBC 30~45个/HP，RBC 20个/HP，潜血阳性，间断低热，最高体温38.0℃。入院后行全腹CT未见异常。患者最可能的诊断为

- A. 克罗恩病
- B. 肠道肿瘤
- C. 阿米巴痢疾
- D. 细菌性痢疾
- E. 溃疡性结肠炎

59. 患者，女性，50岁，4年来反复上腹痛，空腹痛，进食后缓解。胃镜检查提示十二指肠前壁有一直径为1.2cm的溃疡（A期），用兰索拉唑治疗后复查胃镜溃疡愈合，但次年春季溃疡又复发。该患者溃疡复发的最可能原因是

- A. 有幽门螺杆菌（Hp）感染
- B. 兰索拉唑抑酸效果不好
- C. 患者吸烟
- D. 未注意劳逸结合
- E. 未注意饮食卫生

60. 患者，男性，60岁，近2天出现上腹部不适，呕吐，呕吐物为酸臭的宿食，吐后症状可缓解。查体见胃型及蠕动波。该患者的诊断为

- A. 幽门梗阻
- B. 胆囊炎
- C. 肝炎
- D. 胃溃疡
- E. 肠梗阻

61. 女性，70岁，2天前出现右上腹阵发性绞痛，伴皮肤黄染。半年前曾行B超检查提示：胆囊结石。该患者目前最可能的诊断为

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性肝炎
- C. 胆石症
- D. 胰头癌
- E. 肝癌

62. 患者男，20岁。自幼受轻伤后就出血不止。该患者可能的诊断为

- A. 肾炎
- B. 血友病
- C. 过敏性紫癜
- D. 原发性血小板减少性紫癜
- E. 肝炎

63. 男性，69岁，在夜间睡眠时突然出现呼吸困难，不能平卧，伴咳嗽，口唇发绀。既往有高血压病史20年，血压控制不佳。该患者的呼吸困难原因为

- A. 慢性支气管炎急性发作
- B. 右心衰竭
- C. 左心衰竭
- D. 肺栓塞
- E. 支气管哮喘

64. 女性，62岁。反复胸骨后烧灼样疼痛，服用抑酸剂可缓解。该患者的胸痛原因可能为

- A. 胸膜炎
- B. 心绞痛
- C. 胆囊炎
- D. 反流性食管炎
- E. 自发性气胸

65. 女性，35岁，出现恶心、呕吐，呕吐物较多，带粪臭味。该患者可能是

- A. 胃潴留
- B. 中毒
- C. 尿毒症
- D. 肠梗阻
- E. 幽门梗阻

66. 患者，男，62岁。左侧胸痛伴呼吸困难1天。疼痛呈持续性锐痛，咳嗽时加剧，无放射痛、发热。查体：BP 110/80mmHg，呼吸急促，口唇发绀，双肺未闻及干湿啰音；P₂亢进，各瓣膜区未闻及杂音；左下肢水肿。胸痛最可能的原因是

- A. 主动脉夹层
- B. 气胸
- C. 肺梗死
- D. 胸膜炎
- E. 心肌梗死

67. 女性，51岁，5年前行阑尾切除术，1天前出现腹痛、不排气、不排便。该患者产生此症状的原因是

- A. 血管性肠梗阻
- B. 痉挛性肠梗阻

- C. 慢性肠梗阻
- D. 麻痹性肠梗阻
- E. 机械性肠梗阻

68. 患者女性，65岁。高血压病史20余年，近期出现气短、喘息的情况，1小时前于睡眠中憋醒，咳粉红色泡沫痰。查体：端坐位，口唇发绀，双肺闻及湿啰音。以下哪项不是该患者夜间阵发性呼吸困难发生的机制

- A. 静脉回心血量增加
- B. 呼吸中枢敏感性降低
- C. 小支气管收缩
- D. 冠状动脉舒张
- E. 迷走神经兴奋性增高

69. 患者，女性，52岁，主动脉瓣关闭不全病史15年，PDE提示：重度反流。该患者不太可能出现的症状是

- A. 发热
- B. 呼吸困难
- C. 心绞痛
- D. 头晕
- E. 心悸

70. 女性，64岁，腹痛、寒战、发热，恶心、呕吐，黄疸。该患者可能的诊断为

- A. 急性肾炎
- B. 急性胃炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性腹膜炎
- E. 急性胰腺炎

71. 女性，13岁。瘦弱，无发绀，胸骨左缘第2肋间3/6级粗糙连续性杂音，肺动脉瓣区第二心音亢进。X线检查示肺动脉段凸出，心影轻度扩大。诊断考虑

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 动脉导管未闭
- E. 主动脉瓣狭窄

72. 男性，60岁。进行性黄疸。查体：胆囊显著增大，无压痛。该患者可能的诊断为

- A. 胰头癌压迫胆总管
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 胆总管结石
- E. 结核性腹膜炎

73. 男性，72岁。吸烟史32年。近半年来咳嗽，痰中带血，右胸痛，消瘦。胸片见右肺癌。该患者可能先出现的淋巴结肿大是

- A. 腹股沟组群
- B. 右侧锁骨上群
- C. 腋窝组群
- D. 左侧锁骨上群
- E. 颈深下群

74. 女性，31岁，间断上腹痛5年，受凉后易诱发。近1周腹痛加重，2小时前突然呕血400ml。既往：8年前曾患肝炎，HBsAg(-)。查体：血压95/60mmHg(12.7/8kPa)，巩膜无黄染，上腹部无压痛，肝脾未及。最可能的诊断是

- A. 肝炎后肝硬化

- B. 食管贲门黏膜撕裂
- C. 急性糜烂性胃炎
- D. 消化性溃疡出血
- E. 原发性肝癌

75. 患者，男性，55岁。突发昏迷，后出现发热。查体：BP 180/125mmHg，T 38.5℃。该患者可能的诊断是

- A. 流行性出血热
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 脑出血
- E. 安眠药中毒

76. 某患者呼唤可睁眼，答非所问，字语不当，能躲避疼痛，其 Glasgow 评分及意识状态的评估正确的是

- A. 12分，清醒
- B. 10分；意识模糊
- C. 9分，昏迷
- D. 7分，深昏迷
- E. 8分，嗜睡

77. 患者，女，60岁，查体肠鸣音 10次/分，高亢、响亮，呈金属音。该患者属于

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 老年性便秘
- C. 腹膜炎
- D. 低血钾
- E. 机械性肠梗阻

78. 幼儿男，7岁。胸骨左缘3、4肋间听到响亮而粗糙的收缩期杂音。应考虑的疾病为

- A. 室间隔缺损
- B. 动脉导管未闭
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣关闭不全

79. 患者女性，23岁。突发右胸痛、呼吸困难。查体：语音震颤减弱，气管向左侧移位，叩诊右侧为鼓音。该患者查体还可见

- A. 肝浊音界消失
- B. 肝浊音界扩大
- C. 肝浊音界下移
- D. 肝浊音界正常
- E. 肝浊音界上移

80. 一位发热患者，体温在39℃以上，未用任何退热降温措施，24小时内体温波动达2℃以上，最低时体温仍高于正常。这种热型是

- A. 弛张热
- B. 回归热
- C. 稽留热
- D. 波浪热
- E. 间歇热

三、B

- A. 波状热
- B. 弛张热
- C. 间歇热

D. 不规则热

E. 稽留热

81. 伤寒的典型热型为

82. 疟疾的典型热型为

83. 结核病的典型热型为

84. 布氏杆菌病的典型热型为

85. 化脓性炎症的典型热型为

A. 低热、盗汗、咯血

B. 发热、咳嗽、咳脓臭痰

C. 胸痛、高热、咳铁锈痰

D. 一侧胸痛、干咳、发热

E. 刺激性咳嗽、咳血痰、时而发热

86. 肺脓肿特点是

87. 肺结核的特点是

88. 支气管肺癌特点是

89. 大叶性肺炎特点是

90. 胸膜炎的特点是

A. 神经源性膀胱功能障碍

B. 膀胱肿瘤

C. 尿路结石伴感染

D. 肾下垂

E. 尿路梗阻

91. 尿意频繁至不能离开便器，尿量不多，无尿痛，见于

92. 女性 60 岁，今年常有尿频、尿急，无尿痛，尿常规检查正常，可能的诊断是

93. 发热，尿痛，血尿，伴腰部痛向会阴放射，见于

- A. 颅内压增高
- B. 偏头痛
- C. 颈椎病变
- D. 高血压病
- E. 肌纤维组织炎

94. 额部头痛多见于

95. 一侧颞部头痛多见于

- A. 溢出性蛋白尿
- B. 微量白蛋白尿
- C. 大量白蛋白尿
- D. 直立性蛋白尿
- E. 组织性蛋白尿

96. 早期糖尿病肾病

97. 多发性骨髓瘤

- A. 内痔
- B. 肛瘘
- C. 外痔
- D. 直肠息肉
- E. 直肠癌

98. 直肠指检，扪到条索状，伴有轻压痛，挤压时外口有脓性分泌物流出者应考虑

99. 直肠指检，扪到质软可推动的圆形肿块，指套染有新鲜血迹者应考虑

100. 直肠指检，肠壁上扪到高低不平硬块，肠腔狭窄，指套染有脓血和黏液者应考虑

2022 年内科主治医师《基础知识》考前模考大赛（二）答案解析

一、A1

1. 【正确答案】 C

【答案解析】 库瓦西耶征（Courvoisier sign）：在胰头癌压迫胆总管导致阻塞时，发生明显黄疸，且逐渐加深，胆囊显著肿大，但无压痛，称为库瓦西耶征，又称胆总管渐进阻塞征。在胆总管结石梗阻所致的黄疸患者中，由于胆囊也常有慢性炎症，囊壁因纤维而皱缩，且与周围组织粘连而失去移动性，因而有黄疸但胆囊常不肿大，称为库瓦西耶征阴性。

2. 【正确答案】 B

【答案解析】 清音为正常肺的叩诊音，呈中低音调；肺和胸膜叩诊异常包括：浊音和实音、鼓音、过清音。过清音：常见于肺气肿，为肺弹性减弱，含气量增多之故。

3. 【正确答案】 E

【答案解析】 大量心包积液时心搏出量明显下降，心率增快，脉搏细弱，动脉收缩压下降，脉压缩小。

4. 【正确答案】 A

【答案解析】 大叶性肺炎患者如能听到胸膜摩擦音，则该摩擦音的特点为吸气末或呼吸初明显。

5. 【正确答案】 D

【答案解析】 医师手指紧贴检查部位，由浅及深进行滑动触诊，一般顺序：耳前、耳后、乳突区、枕骨下区、颈后三角、颈前三角。

6. 【正确答案】 C

【答案解析】 血管壁功能异常多见于：①遗传性出血性毛细血管扩张症、血管性假性血友病；②过敏性紫癜、单纯性紫癜、老年性紫癜及机械性紫癜等；③严重感染、化学物质或药物中毒及代谢障碍，维生素 C 或维生素 PP 缺乏，尿毒症，动脉硬化等。

7. 【正确答案】 A

【答案解析】 血小板无力症是一种遗传性出血病，特点为血细胞对多种生理诱聚剂反应低下或缺如。

8. 【正确答案】 E

【答案解析】 H^+ 增加，易使 pH 下降，导致代谢性酸中毒，现在肾小管泌氢功能受损使 H^+ 不增加，故不影响代谢性酸中毒。

9. 【正确答案】 B

【答案解析】 在我国瓣膜性心脏病以风湿性心脏病最为常见。

10. 【正确答案】 B

【答案解析】 导致肝硬化的病因有 10 余种，我国目前以乙型肝炎病毒为主，欧美国家酒精及丙型肝炎病毒为常见原因。

11. 【正确答案】 E

【答案解析】 诱发胃溃疡的病因中，幽门螺杆菌感染（Hp）最为常见，因服用非甾体类抗炎药造成的胃溃疡是另一主要病因，而胃酸过高是 Hp 感染的结果。胃酸和/或胃蛋白酶引起的黏膜自身消化是导致溃疡形成的损伤因素。胃酸是十二指肠溃疡发生的决定性因素。

12. 【正确答案】 D

【答案解析】 高钾血症的病因：①肾排钾减少：如急性肾衰竭；②细胞内的钾移出：如酸中毒、溶血等；③含钾药物输入过多；④输入库存血过多；⑤洋地黄中毒。

13. 【正确答案】 A

【答案解析】 原粒细胞微分化型 (M_0)。原粒细胞白血病未分化型 (M_1)。原粒细胞白血病部分分化型 (M_2) 分以下两个亚型： M_{2a} 骨髓中原粒细胞； M_{2b} 骨髓中原始及早幼粒细胞明显增多，以异常的中性中幼粒细胞增生为主。颗粒增多的早幼粒细胞白血病 (M_3) 骨髓中以颗粒增多的异常早幼粒细胞增生为主。

14. 【正确答案】 C

【答案解析】 阿司匹林由于使用量的不同，有不同的药理作用：①小剂量抑制血小板环加氧酶→ TXA_2 ↓→抑制血小板聚集→预防脑血栓形成；②中剂量时抑制 PG 合成酶（环加氧酶）→解热镇痛→用于感冒发热、慢性钝痛；③大剂量时 PG 合成减少，保护溶酶体膜→抗炎、抗风湿→用于急性风湿热关节炎；首先用于类风湿关节炎。

15. 【正确答案】 B

【答案解析】 G6PD 缺乏症为 X 连锁不完全显性遗传，男性只有 1 条 X 染色体，一旦这条染色体 G6PD 基因缺陷，则为半合子，临床上常表现为 G6PD 重度缺乏；而女性有 2 条 X 染色体，如果仅有 1 条 X 染色体：G6PD 基因缺陷，则为杂合子，其酶活性的变异范围较大。因基因变异导致红细胞 G6PD 酶活性降低而发病。

16. 【正确答案】 B

【答案解析】 利尿药、雌激素、促皮质激素、维生素 D、降糖灵、四环素、硫唑嘌呤、醋碘苯酸钠、红霉素、甲硝唑、罗红霉素、异烟肼、呋喃妥因、赛庚啶、降压嗪、消胆胺及氯丙嗪、卡马西平、丙戊酸钠等，也会引起胰腺炎。因此，当使用上述药物期间，如果出现急性、亚急性胰腺炎或急性腹痛而无其他

原因可以解释时，应考虑到药物性胰腺炎的可能性，注意观察血清酶的变化，结合 B 超或 CT 检查应尽早明确诊断。

17. 【正确答案】 B

【答案解析】 女子体温比男子略高，排卵之日最低；而不是排卵之日最高。

18. 【正确答案】 D

【答案解析】 血管舒缩障碍见于单纯性晕厥、体位性低血压、颈动脉窦综合征、排尿性晕厥、咳嗽性晕厥及疼痛性晕厥等。

19. 【正确答案】 D

【答案解析】 瞳孔缩小见于有机磷、巴比妥类、吗啡等药物中毒患者。

20. 【正确答案】 A

【答案解析】 肋骨共有 12 对。于背部与相应的胸椎相连，由后上方向前下方倾斜，其倾斜度上方略小，下方稍大。第 1~7 肋骨在前胸部与各自的肋软骨连接，第 8~10 肋骨与 3 个联合一起的肋软骨连接后，再与胸骨相连，构成胸廓的骨性支架。第 11~12 肋骨不与胸骨相连，其前端呈游离状，称为浮肋。

21. 【正确答案】 A

【答案解析】 稽留热是指体温恒定地维持在 39~40℃ 以上的高水平，达数天或数周，24 小时内体温波动范围不超过 1℃。常见于大叶性肺炎、斑疹伤寒及伤寒高热期。

22. 【正确答案】 A

【答案解析】 尿三杯试验可以帮助判断是否为全程血尿。病人在一次排尿过程中，收集初、中、终各段的尿液镜检红细胞。初段血尿提示前尿道病变，终末血尿提示膀胱三角区、后尿道、精囊、前列腺病变，全程血尿提示膀胱、输尿管及肾脏的疾病。

23. 【正确答案】 C

【答案解析】 青光眼引起的呕吐属于反射性呕吐。

24. 【正确答案】 D

【答案解析】 如果腹水量少，用叩诊法不能查出时，若病情许可可让患者取肘膝位，使脐部处于最低部位。由侧腹部向脐部叩诊，如由鼓音转为浊音，则提示有 120ml 以上腹水的可能（即水坑征）。

25. 【正确答案】 A

【答案解析】 记忆类型考点。

26. 【正确答案】 E

【答案解析】 语音震颤减弱或消失，主要见于：①肺泡内含气量过多，如慢性阻塞性肺疾病；②支气管阻塞，如阻塞性肺不张；③大量胸腔积液或气胸；④胸膜显著增厚粘连；⑤胸壁皮下气肿。

27. 【正确答案】 B

【答案解析】 当肠梗阻出现绞窄时，腹痛持续剧烈并阵发性加重，并由于电解质紊乱、酸碱平衡失调、感染中毒致严重休克。A 项，输尿管结石肾绞痛为阵发性剧痛向下腹部或会阴部放射，可伴血尿为其特点。C 项，溃疡病急性发作常为持续性腹痛，一般不会发生阵发性加剧至休克。D 项，急性阑尾炎常是转移性右下腹痛。E 项，急性胆囊炎常是右上腹剧烈绞痛，可阵发加重向右肩背放射。

28. 【正确答案】 B

【答案解析】 吡嗪酰胺对人结核分枝杆菌有较好的抗菌作用，对牛结核分枝杆菌及其他非结核分枝杆菌不敏感，在酸性环境中有较强的杀菌作用，在 pH 5.5

时杀菌作用最强，对在酸性环境中缓慢生长的吞噬细胞内的结核分枝杆菌是目前最佳的杀菌药物。

29. 【正确答案】 E

【答案解析】 口腔黏膜出现蓝黑色色素沉着斑片多为肾上腺皮质功能减退症（Addison 病）。

30. 【正确答案】 D

【答案解析】 逆行胰胆管造影（ERCP）：可通过内镜直接观察壶腹区与乳头部有无病变，可经造影区别肝外或肝内胆管阻塞的部位，也可间接了解胰腺有无病变。

31. 【正确答案】 B

【答案解析】 亚硝酸盐中毒的解毒药是亚甲蓝。小剂量亚甲蓝可使高铁血红蛋白还原成正常血红蛋白，用于治疗亚硝酸盐、苯胺、硝基胺等中毒引起的高铁血红蛋白血症。

32. 【正确答案】 E

【答案解析】 心室夺获与室性融合波：室速发作时少数室上性冲动可下传心室，产生心室夺获，表现为在 P 波之后，提前发生一次正常的 QRS 波群。室性融合波的 QRS 波群形态介于窦性与异位心室搏动之间，其意义为部分夺获心室。心室夺获与室性融合波的存在对确立室性心动过速诊断提供重要依据。因此答案选 E。

33. 【正确答案】 A

【答案解析】 系统性红斑狼疮患者有心血管表现以心包炎最常见。约 10%有心肌炎及周围血管病。

34. 【正确答案】 D

【答案解析】肝硬化患者 Child-Pugh 分级标准包括 5 个指标：肝性脑病、腹水、总胆红素、白蛋白、凝血酶原时间，其中每个指标分成 3 个等级。因此答案选 D。

35. 【正确答案】 A

【答案解析】白血病在化疗同时给予别嘌醇每次 100mg，每日 3 次，以抑制尿酸合成。

36. 【正确答案】 E

【答案解析】癌前变化分为癌前疾病（即癌前状态）和癌前病变。前者是指与胃癌相关的胃良性疾病，有发生胃癌的危险性；后者是指较易转变为癌组织的病理学变化，主要指异型增生。癌前疾病（或病变）并不是一定会发展为恶性肿瘤。

37. 【正确答案】 A

【答案解析】目前慢性粒细胞白血病的化疗首选羟基脲。羟基脲为细胞周期特异性抑制 DNA 合成的药物，起效快，持续时间短。用药两、三天白细胞即迅速下降，停药后又很快回升。此外，也可选用白消安、 α -干扰素等。

38. 【正确答案】 D

【答案解析】慢性肺源性心脏病大多由支气管、肺疾病引起，以慢阻肺（慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿）最为多见，约占 80%~90%，其次为支气管哮喘、支气管扩张、肺结核、间质性肺疾病等。

39. 【正确答案】 C

【答案解析】慢性心力衰竭的各种诱因中，呼吸道感染是最常见，最重要的诱因。

40. 【正确答案】 A

【答案解析】 浸润性突眼与甲状腺毒症所致的交感神经若奋性增高无关。

41. 【正确答案】 D

【答案解析】 腹部压痛部位不固定见于肠易激综合征。

42. 【正确答案】 E

【答案解析】 蜘蛛痣多出现于上腔静脉分布的区域内，如面、颈、手背、上臂、前胸和肩部等处，其大小不等。

43. 【正确答案】 E

【答案解析】 鉴别血尿与血红蛋白尿的主要手段是尿沉渣检查。

44. 【正确答案】 A

【答案解析】 器质性三尖瓣关闭不全听诊特点与器质性二尖瓣关闭不全类似，但不传至腋下，可伴颈静脉和肝脏收缩期搏动。

45. 【正确答案】 E

【答案解析】 内脏性腹痛是腹内某一器官的痛觉信号由交感神经传入脊髓引起。其疼痛特点为：①疼痛部位不确切，接近腹中线；②疼痛感觉模糊，多为痉挛、不适、钝痛、灼痛；③常伴恶心、呕吐、出汗等其他自主神经兴奋症状。E项，腹痛可因咳嗽、体位变化而加重是躯体性腹痛的特点。

46. 【正确答案】 A

【答案解析】 胃蛋白酶属于助消化药。

47. 【正确答案】 A

【答案解析】 脂肪瘤好发于四肢、躯干。表皮样囊肿多见于易受外伤或磨损部位，如臀部、肘部。皮肤癌常见的类型如基底细胞癌和鳞癌对放疗都很敏感。海绵状血管瘤应尽早实施手术切除术。

48. 【正确答案】 D

【答案解析】 帕金森患者一般擦地而行，呈前冲状，易跌倒。

49. 【正确答案】 A

【答案解析】 周围性眩晕前庭器官病变，听力受损，眼球量水平或旋转性震颤，无垂直性震颤，向健侧注视眼震颤加重。

50. 【正确答案】 C

【答案解析】 临床上强直性脊柱炎患者中约 90%HLA-B27 阳性。

二、A2

51. 【正确答案】 B

【答案解析】 糖尿病酮症酸中毒时，当用胰岛素调节高血糖的速度过快或山梨糖醇代谢非常缓慢时，脑渗透压会缓慢下降且处于不平衡的状态，形成明显的渗透压梯度，从而导致脑水肿。

52. 【正确答案】 E

【答案解析】 患者情绪激动后出现剧烈头痛，考虑为蛛网膜下腔出血。蛛网膜下腔出血最具特征性的体征为颈项强直等脑膜刺激征。患者之前没有高血压病史，所以不考虑脑出血。

53. 【正确答案】 B

【答案解析】 隐匿性肾炎蛋白尿成因为免疫因素作用致肾小球损伤的结果，为肾小球性蛋白尿。

54. 【正确答案】 C

【答案解析】 上行感染是 95%单纯尿路感染的感染途径。

55. 【正确答案】 B

【答案解析】 复杂性尿路感染的病原菌谱中葡萄球菌属较单纯尿路感染明显增多。

56. 【正确答案】 B

【答案解析】 肠易激综合征是一组持续或间歇发作，以腹痛、腹胀、排便习惯和（或）大便性状改变为临床表现，而缺乏胃肠道结构和生化异常的肠道功能紊乱性疾病。腹痛多于排便后缓解，部分病人易在进食后出现，腹痛可发生于腹部任何部位，局限性或弥漫性，疼痛性质多样。腹痛不会进行性加重，夜间睡眠后极少有痛醒者。

57. 【正确答案】 A

【答案解析】 该患者同时有肝硬化及消化性溃疡，但是该次出血急，并且出血量大，因此首先考虑食管胃底静脉曲张破裂出血。

58. 【正确答案】 D

【答案解析】 细菌性痢疾简称菌痢；是志贺菌属（痢疾杆菌）引起的肠道传染病。临床表现主要有发冷、发热、腹痛、腹泻、里急后重、排黏液脓血样大便。中毒性菌痢起病急骤、突然高热、反复惊厥、嗜睡、昏迷，迅速发生循环衰竭和呼吸衰竭，而肠道症状轻或无，病情凶险。慢性菌痢患者可反复发作或迁延不愈达2个月以上，部分病例可能与急性期治疗不当或致病菌种类有关，主要病理变化为结肠溃疡性病变，溃疡边缘可有息肉形成，溃疡愈合后留有瘢痕。

59. 【正确答案】 A

【答案解析】 消化性溃疡系Hp最密切相关性疾病，一般认为多数情况下，Hp不影响溃疡的愈合，但与复发相关性很大，所以抗酸治疗后，溃疡愈合，但很快又复发，因此，该患者溃疡复发的最大可能是存在Hp感染。

60. 【正确答案】 A

【答案解析】 呕吐物为酸臭的宿食，吐后症状减轻，查体见胃型及蠕动波为幽门梗阻的典型表现。

61. 【正确答案】 C

【答案解析】 胆石症的疼痛特点为右上腹阵发性绞痛。

62. 【正确答案】 B

【答案解析】 自幼发病提示：血友病。

63. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性左心衰竭的原因为急性左室后负荷增高，有急性肺水肿表现；如突发胸闷、气急、端坐呼吸、面色苍白、口唇发绀、阵咳、咳出大量粉红色泡沫痰，严重者咯血，听诊两肺有广泛湿啰音和哮鸣音。

64. 【正确答案】 D

【答案解析】 胸骨后烧灼感或疼痛为反流性食管炎的主要症状。

65. 【正确答案】 D

【答案解析】 肠梗阻呕吐物可有粪臭味。

66. 【正确答案】 C

【答案解析】 肺梗死三联征：呼吸困难、胸痛及咯血。体征：呼吸系统体征——呼吸急促，口唇发绀；循环系统体征—— P_2 亢进，血压变化，心动过速，三尖瓣区收缩期杂音。故选 C。

67. 【正确答案】 E

【答案解析】 机械性肠梗阻常见的病因有：肠粘连、肠扭转、肠套叠、成团蛔虫异物或粪块阻塞肠腔。该患者为肠粘连所致。

68. 【正确答案】 D

【答案解析】 夜间阵发性呼吸困难的机制：迷走神经兴奋性增高，小支气管痉挛，呼吸中枢兴奋性降低，静脉回心血量增加。

69. 【正确答案】 A

【答案解析】 主动脉瓣关闭不全患者的症状主要包括：心悸、头晕、心绞痛、呼吸困难。其他症状可有乏力、活动耐力下降等。

70. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性胆囊炎三联征：痛、热、黄。

71. 【正确答案】 D

【答案解析】 肺动脉瓣区第二心音亢进，X线检查示肺动脉段凸出，心影轻度扩大，考虑为动脉导管未闭。

72. 【正确答案】 A

【答案解析】 进行性黄疸是胰头癌的典型表现。

73. 【正确答案】 B

【答案解析】 肺癌时一般锁骨上群淋巴结先肿大。

74. 【正确答案】 D

【答案解析】 消化性溃疡的典型症状为上腹痛，性质可有钝痛、灼痛、胀痛、剧痛、饥饿样不适。特点：①慢性过程，可达数年或10余年；②反复或周期性发作，发作期可为数周或数月，发作有季节性，典型者多在季节变化时发生，如秋冬和冬春之交发病；③部分病人有与进餐相关的节律性上腹痛，餐后痛多见于GU，饥饿痛或夜间痛、进餐缓解多见于DU；④腹痛可被抑酸或抗酸剂缓解。常见并发症是出血。该青年女性患者间断性上腹痛，受凉诱发。突然出现呕血，血压低。最可能诊断是消化性溃疡出血。

75. 【正确答案】 D

【答案解析】 脑出血多数有高血压病史，中老年人多见。突发剧烈头痛伴呕吐，多有意识障碍，发病时血压较高，神经系统局灶症候与出血部位和出血量有关。

76. 【正确答案】 B

【答案解析】 Glasgow 昏迷指数的评估有睁眼反应、语言反应和肢体运动三方面，三个方面的分数总和即为昏迷指数。

(1) 睁眼反应。4分：自然睁眼。靠近患者时，患者能自主睁眼，术者不应说话、不应接触患者。3分：呼唤会睁眼。正常音量呼叫患者，或高音量呼叫，不能接触患者。2分：有刺激或痛楚会睁眼。1分：对于刺激无反应。

(2) 语言反应。5分：说话有条理，定向能力正确，能清晰表达自己的名字、居住城市或当前所在地点、当年年份和月份。4分：可应答，但有答非所问的情形，定向能力障碍，有答错情况。3分：可说出单字，完全不能进行对话，只能说简短句或单个字。2分：可发出声音。对疼痛刺激仅能发出无意义叫声。1分：无任何反应。T分：因气管插管或切开而无法发声，以T (tube) 表示。D分：平素有言语障碍史，以D (dysphasic) 表示。

(3) 肢体运动。6分：可依指令动作，按指令完成2次不同的动作。5分：施以刺激时，可定位出疼痛位置，予疼痛刺激时，患者能移动肢体尝试去除刺激。疼痛刺激以压眶上神经为金标准。4分：对疼痛刺激有反应，肢体会回缩

(withdrawal)。3分：对疼痛刺激有反应，肢体会弯曲，呈“去皮质强直”姿势。2分：对疼痛刺激有反应，肢体会伸直，呈“去脑强直”姿势。1分：无任何反应。

Glasgow 昏迷评分法最高分为15分，表示意识清楚；12~14分为轻度意识障碍；9~11分为中度意识障碍；8分以下为昏迷；分数越低则意识障碍越重。选评判时的最好反应计分。注意运动评分左侧右侧可能不同，用较高的分数进行评分。

77. 【正确答案】 E

【答案解析】 机械性肠梗阻时肠鸣音增强、高亢、响亮，呈金属音。

78. 【正确答案】 A

【答案解析】 室间隔缺损时于胸骨左缘 3、4 肋间可闻及响亮而粗糙的收缩期杂音。

79. 【正确答案】 C

【答案解析】 右侧气胸时导致横膈下移，肝脏也相应下移。

80. 【正确答案】 A

【答案解析】 弛张热：体温常在 39℃ 以上，24 小时波动范围超过 2℃。但都在正常水平以上。见于败血症、风湿热、重症肺结核、化脓性炎症和感染性心内膜炎等。

三、B

81. 【正确答案】 E

82. 【正确答案】 C

83. 【正确答案】 D

84. 【正确答案】 A

85. 【正确答案】 B

【答案解析】 稽留热常见于大叶肺炎、斑疹伤寒及伤寒高热期；弛张热常见于败血症和重症肺结核等；间歇热常见于疟疾、急性肾盂肾炎、败血症等；波状热常见于布氏杆菌病；不规则热见于结核病、风湿热、支气管肺炎等。

86. 【正确答案】 B

87. 【正确答案】 A

88. 【正确答案】 E

89. 【正确答案】 C

90. 【正确答案】 D

【答案解析】 肺脓肿，咳嗽、咳黏液痰或黏液脓痰。炎症波及局部胸膜可引起胸痛。病变范围较大，可出现气急，咳嗽加剧，脓肿破溃于支气管，咳出大量脓臭痰，每日可达 300~500ml，因有厌氧菌感染，痰有臭味；

肺结核，起病可急可缓，多为低热（午后为著）、盗汗、乏力、纳差、消瘦、女性月经失调等；呼吸道症状有咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、不同程度胸闷或呼吸困难；

肺癌的症状大致分为：局部症状、全身症状、浸润和转移症状以及肺外症状等。局部症状是由肿瘤在局部生长时刺激、阻塞、浸润和压迫组织所引起的症状，常见咳嗽、痰中带血或咯血、胸痛、胸闷、气急、声音嘶哑等。全身症状可出现发热、消瘦和恶液质等。肺癌常见转移部位包括淋巴结、胸膜、脑、肝、肾上腺、骨等，肿瘤出现浸润转移时可出现相应的症状和体征；

大叶性肺炎起病急骤，寒战、高热、胸痛、咳嗽、咳铁锈色痰；

胸膜炎主要临床表现为胸痛、咳嗽、胸闷、气急，甚则呼吸困难，感染性胸膜炎或胸腔积液继发感染时，可有恶寒、发热。病情轻者可无症状。不同病因所致的胸膜炎可伴有相应疾病的临床表现。

91. 【正确答案】 B

【答案解析】 膀胱容量减少性尿频，表现为持续性尿频，药物治疗难以缓解，每次尿量少，见于膀胱占位性病变。

92. 【正确答案】 A

【答案解析】 神经源性膀胱功能障碍，尿频而每次尿量少，不伴尿急、尿痛，尿液镜检无炎性细胞，见于中枢及周围神经病变如癔症、神经源性膀胱。

93. 【正确答案】 C

【答案解析】 炎症性尿频，每次尿量少，伴有尿急和尿痛，尿液镜检可见炎性细胞。

94. **【正确答案】** A

【答案解析】 额部头痛一般由天幕上病变引起，但也见于鼻窦炎、颅内压增高
等。

95. **【正确答案】** B

【答案解析】 一侧颞部头痛可见于青光眼、虹膜睫状体炎；偏头痛、颞动脉炎、
神经痛等。

96. **【正确答案】** B

【答案解析】 早期糖尿病肾病又称微量白蛋白尿期，一般出现在糖尿病发病
10~15年，主要表现为UAE持续高于 $20\sim 200\mu\text{g}/\text{min}$ （相当于 $30\sim 300\text{mg}/24\text{h}$ ），
微量白蛋白尿逐年增加，但是GFR仍增高。

97. **【正确答案】** A

【答案解析】 溢出性蛋白尿由于血浆中某种异常小分子量蛋白质产生过多，经
肾小球滤过剧增，超过了肾小管的重吸收能力而产生的蛋白尿。如免疫球蛋白
轻链、血红蛋白等。常见于多发性骨髓瘤的本-周氏蛋白尿、溶血性贫血的血红
蛋白尿。组织性蛋白尿为肾组织受到破坏后结构分解，胞质中的酶和蛋白质释
出所致的蛋白尿，多为小分子蛋白质。见于恶性肿瘤等。

98. 【正确答案】 B

【答案解析】 肛痿：可摸到索状物，有时在肛痿内口可扪到小硬结或凹陷。

99. 【正确答案】 D

【答案解析】 直肠指检，扪到质软可推动的圆形肿块，指套染有新鲜血迹者应考虑为直肠息肉。

而内痔与外痔的区别，请您记住最典型的一句话“内痔不疼，外痔疼”再结合其体征表现进行判别即可。

100. 【正确答案】 E

【答案解析】 1. 直肠癌：在肠壁上可摸到高低不平的硬块，其表面可有溃疡，肠腔常狭窄，指套上往往染有脓血和黏液。

2. 直肠息肉：可摸到质软而可推动的肿块，指套上常染有血迹。

3. 内痔：一般内痔是柔软的，即使摸到也不能分辨其大小和多少，但如有血栓形成，则可摸到光滑的硬结。

4. 肛痿：可摸到索状物，有时在肛痿内口可扪到小硬结或凹陷。

5. 肛门直肠周围脓肿：骨盆直肠间隙脓肿及直肠后间隙脓肿，在直肠内可摸到压痛性肿块，表面较光滑。其他间隙脓肿可用拇、食指作双指触诊检查，即食指放在直肠内，拇指放在肛周皮肤上，拇、食指触诊，可以发现肛管前深、后深间隙脓肿、坐骨直肠间隙脓肿或肛周脓肿。

6. 肛乳头瘤：可摸到质地中等而可推动的、长蒂肿物，指套干净。