

医学教育网护士执业资格: 《答疑周刊》2023年第10期

问题索引:

1. 【问题】甲状腺功能的基础代谢分级?
2. 【问题】脱水后补液原则为?
3. 【问题】癫痫大发作与癫痫小发作区别是什么?

具体解答:

1. 【问题】甲状腺功能的基础代谢分级?

【解答】基础代谢率测定: [医学教育网]清晨、空腹和静卧

基础代谢%=(脉率+脉压)-111

- ①正常: -10%~+10%
- ②轻度: +20%~+30%
- ③中度: +30%~+60%
- ④重度: +60%以上

2. 【问题】脱水后补液原则为?

【解答】先快后慢、先浓后淡、先盐后糖、先晶后胶, 见尿补钾。

第一天的补液总量包括累计损失量、继续损失量和生理需要量三方面。

1) 补充累计损失量: ①定输液量(定量) ②定输液种类(定性) ③定输液速度(定速)。[医学/教育网]

2) 补充继续损失量。

3) 供给生理需要量

实际补液过程中, 对补液量的计算为以上三部分合计, 一般轻度脱水约 90~

120ml/kg, 中度脱水约 120~150ml/kg, 重度脱水约 150~180ml/kg。

3. 【问题】癫痫大发作与癫痫小发作区别是什么?

【解答】失神发作: 通常称小发作, 多见于儿童, 病人突然意识短暂丧失, 停止当时的活动, 呼之不应, 两眼瞪视不动, 一般不会跌倒, 手中持物可坠落, 持续 5~10 秒后立即清醒, 继续原先的活动, 但对发作无记忆。

全面强直-阵挛发作：又称大发作，是最常见的发作类型之一，以意识丧失和双侧强直后出现阵挛为临床特征。[医学教育网]发作前可有前驱症状如头晕、气血上涌、上腹部异常感、幻觉等，发作分3期。强直期、阵挛期、发作后期；自发作开始至意识恢复约历时5~10分钟。



正保医学教育网
www.med66.com