

医学教育网内科主治医师考试:《答疑周刊》2023年第21期

消化内科学在内科主治医师考试中是相对来说比较简单的一科,但是零碎的内容比较多,还是需要大家重点复习,今天一起来做几道肝硬化的题目。

问题索引:

1. 是否了解肝硬化腹水治疗必须遵循的原则?
2. 肝性脑病时应用抗生素的主要目的是什么?
3. 肝硬化腹水少尿时首选哪种利尿剂?

具体解答:

1. 下列哪一项不是肝硬化腹水治疗必须遵循的原则

- A. 腹水患者必须限制钠、水的摄入
- B. 保钾利尿剂和排钠利尿剂并用
- C. 服用呋塞米利尿时应补充氯化钾
- D. 尽快利尿消退腹水促使病情缓解
- E. 腹水减退后, 仍需限制钠的摄入

【正确答案】 D

【答案解析】 不能快速利尿, 应用利尿药时, 要经常监测电解质的变化, 防止低钾等水电解质酸碱失衡及肝肾综合征的发生。故D的说法是错误的。[医学教育网原创]

2. 肝性脑病时应用抗生素的主要目的是

- A. 抑制肠道细菌, 减少氨的形成
- B. 减少真菌繁殖
- C. 预防原发性腹膜炎
- D. 预防继发性肠道感染
- E. 清除肠道毒素

【正确答案】 A

【答案解析】 肝性脑病治疗原则中减少肠内毒物的生成和吸收。其中就提到抑制细菌生长: 如口服新霉素、氨苄西林、乳果糖等可减少氨的形成和吸收。

3. 肝硬化腹水少尿时首选哪种利尿剂

- A. 螺内酯+呋塞米
- B. 呋塞米
- C. 氨苯蝶啶
- D. 氢氯噻嗪
- E. 呋塞米+双氢克尿噻

【正确答案】 A

【答案解析】 临床常用的利尿剂为螺内酯和呋塞米。前者为潴钾利尿剂，单独长期大量使用可发生高钾血症；后者为排钾利尿剂，单独应用应同时补钾。腹水患者中有明显的电解质紊乱，容易因利尿剂的应用而发生肝性脑病，所以不宜单独使用强烈的排钾利尿剂，应联合用药。既可加强疗效，又可减少不良反应。故选 A。[医学教育网原创]