

医学教育网中级主管护师：《答疑周刊》2019 年第 16 期

1. 【问题】足月新生儿出生时存在，以后也不消失的反射？

【解答】出生时即存在，终生不消失的反射，如角膜反射、瞳孔反射、结膜反射、吞咽反射。这些反射减弱或消失，提示神经系统有病理改变。腹壁反射要到 1 岁后才比较容易引出，最初反射呈弥散性。提睾反射要到出生 4~6 个月后才明显。

2. 【问题】中国新九分法具体是怎么分的？

【解答】中国新九分法：将人体按体表面积划分为 11 个 9% 的等份，另加 1%，构成 100%。适用于较大面积烧伤的评估，可简记为：3、3、3（头、面、颈），5、6、7（双手、双前臂、双上臂），5、7、13、21（双臀、双足、双小腿、双大腿），13、13（躯干），会阴 1。

部位	成人各部位面积（%）	小儿各部位面积（%）
头颈	9×1=9（头部 3 面部 3 颈部 3）	9+（12-年龄）
双上肢	9×2=18（双手 5 双前臂 6 双上臂 7）	9×2
躯干	9×3=27（腹侧 13 背侧 13 会阴 1）	9×3
双下肢	9×5+1=46（双臀 5 双大腿 21 双小腿 13 双足 7）	46-（12-年龄）

3. 【问题】新生 Apgar 评分具体怎么评？

【解答】

新生儿 Apgar 评分标准

体征	评分标准			评分	
	0	1	2	1分钟	5分钟
皮肤颜色	青紫或苍白	身体红，四肢青紫	全身红		
心率(次/分)	无	<100	>100		
弹足底或插鼻反应	无反应	有些动作，如皱眉	哭，喷嚏		
肌张力	松弛	四肢略屈曲	四肢活动		
呼吸	无	慢，不规则	正常，哭声响		

4. 【问题】小儿腹泻的致病菌到底是轮状病毒还是大肠杆菌？

【解答】两者都是，按季节区别。轮状病毒肠炎秋、冬季流行，大肠埃希菌肠炎多发生在 5~8 月气温较高的季节。

(1) 轮状病毒肠炎：秋、冬季流行，多见于 6~24 个月的婴幼儿，潜伏期 1~3 天，起病较急，常伴有上呼吸道感染症状，一般无明显中毒症状。大便量多，呈黄色水样或蛋花汤样，无腥臭味，常伴有脱水、酸中毒。本病有自限性，病程约 3~8 天，也可长达 20 天左右。大

便镜检偶见少量白细胞。感染后 1~3 天大便即有病毒排出，最长可达 6 天，血清抗体一般在感染后 3 周上升。

(2) 大肠埃希菌肠炎：多发生在 5~8 月气温较高的季节，致病性大肠埃希菌肠炎和产毒性大肠埃希菌肠炎大便呈蛋花汤样或水样，混有黏液，全身中毒症状较明显，可发生水、电解质紊乱，酸中毒。侵袭性大肠埃希菌肠炎可排出痢疾样黏液脓血便，腥臭，有较多黏液，常有恶心呕吐、里急后重，可出现严重的全身中毒症状甚至休克，大便镜检有较多白细胞，甚至有数量不等红细胞。出血性大肠埃希菌肠炎开始为黄色水样便，后转为血水便，有特殊臭味，伴腹痛，大便镜检有大量红细胞，常无白细胞。

5. 【问题】肾盂和输尿管轻度扩张为什么会尿路逆流？

【解答】受孕激素影响，肾盂和输尿管自妊娠中期轻度扩张，输尿管增粗及蠕动减弱，尿流缓慢，且右侧输尿管受右旋妊娠子宫压迫，致使输尿管有尿液逆流现象。

