

【牙体牙髓病学】

银汞合金充填后, 患牙需等待多久后才能咀嚼

A. 3h

B. 6h

C. 12h

D. 24h

E. 48h

【正确答案】D

【答案解析】

银汞合金: 充填完成后嘱患者 24 小时内, 不用该牙咀嚼。

【牙体牙髓病学】

以下关于银汞合金的备洞要求, 不恰当的说法是

A. 需做成盒形洞

B. 有一定固定形状

C. 洞缘曲线圆钝

D. 点线角锐利

E. 去除无基釉

【正确答案】D

【答案解析】

点线角应圆钝。

【口腔黏膜病学】

急性假膜型念珠菌口炎多发于

A. 老年人

B. 青少年

C. 新生儿

D. 更年期妇女

E. 40 岁左右的中年人

【正确答案】C

【答案解析】

可发生于任何年龄的人, 多见于长期使用激素、HIV 感染者、免疫缺陷者、婴幼儿及衰弱者。但以新生儿最多见, 发生率为 4%, 又称新生儿鹅口疮或雪口病。

【口腔黏膜病学】

急性红斑型念珠菌型口炎的表现是

- A. 病损区黏膜充血, 有散在的色白如雪的柔软小斑点
- B. 病损区黏膜表现为结节状或颗粒状增生, 或为固着紧密的白色角质斑块
- C. 病损区黏膜呈亮红色水肿, 或见斑点状假膜
- D. 病损区黏膜充血糜烂, 舌背乳头成团块萎缩, 周围舌苔增厚
- E. 病损区黏膜出现珠光白色网纹伴充血

【正确答案】D

【答案解析】

临床表现为黏膜上出现外形弥散的红斑, 以舌黏膜多见, 严重时舌背黏膜呈鲜红色并有舌乳头萎缩, 双颊、上腭及口角也可有红色斑块。黏膜红斑是由于上皮萎缩加上黏膜充血所致, 因此, 近年来有学者认为该型以红斑型取代以前命名的萎缩型较为合理。若继发于假膜型, 则可见假膜。自觉症状为口干、味觉异常、疼痛及烧灼感。