

【牙体牙髓病学】

慢性根尖周脓肿的诊断主要依靠

A. 牙髓电活力检查

B. 温度试验

C. 咬诊和叩诊

D. 探诊和扪诊

E. X线检查

【正确答案】E

【答案解析】

不同类型的慢性根尖周炎X线片表现特点不同:

①慢性根尖周肉芽肿为围绕患牙根尖部的圆形或椭圆形的透射区,边界清楚。

②慢性根尖周脓肿为根尖部不规则,边界比较模糊的透射区,周围的骨质也较疏松。

③根尖周囊肿为根尖周圆形透射区,有阻射的白线围绕。

④X线检查见围绕患牙根尖部的透射区是诊断慢性根尖周炎的关键依据。

【牙体牙髓病学】

临床上最常见的根尖周病是

A. 急性根尖周炎浆液期

B. 急性根尖周炎化脓期

C. 慢性根尖周炎

D. 慢性牙髓炎

E. 化脓性颌骨骨髓炎

【正确答案】C

【答案解析】

慢性根尖周炎是临床上最常见的根尖周疾病,很多急性根尖周炎均是慢性病变的急性发作。

【口腔黏膜病学】

以下哪一项属于梅-罗氏综合征的临床表现

A. 沟纹舌、肉芽肿性唇炎、面神经麻痹

B. 沟纹舌、巨舌、面肌抽搐

C. 面瘫、巨舌、口角炎

D. 肉芽肿性唇炎、巨舌、面肌抽搐

E. 地图舌、肉芽肿性唇炎、面肌抽搐

【正确答案】A

【答案解析】

沟纹舌, 同时出现肉芽肿性唇炎, 面神经麻痹或有面神经麻痹史, 则诊断为梅-罗综合征。

**【口腔黏膜病学】**

地图舌任何年龄均可发生, 但多见于

A. 儿童

B. 青年

C. 中年

D. 老年

E. 成人

**【正确答案】** A

**【答案解析】**

地图舌任何年龄均可发生, 但多见于儿童, 成年人较少, 男女均可发病, 无季节性, 一般无自觉症状, 合并感染时, 可出现局部刺激痛。