

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2019 年第 40 期

1. 【问题】结肠癌和直肠癌的早期表现是什么？

【解答】结肠癌最早出现的症状是排便习惯及粪便性状的改变，多表现为排便次数增加，腹泻、便秘、粪便中带脓血或黏液。

直肠癌早期直肠癌主要表现为排便习惯改变和便血，病人便意频繁、便前肛门下坠感、里急后重、排便不尽感等。

2. 【问题】内痔分为几期？依据是什么？

【解答】内痔 位于齿状线以上，表面覆盖直肠黏膜。好发于直肠下端的左侧、右前或右后方（截石位 3、7、11 点）。主要表现为排便时无痛性出血和痔块脱出，分为 4 期。I 期：以排便时无痛性出血，痔块不脱出肛门外。II 期：便血加重，严重时呈喷射状，排便时痔块脱出，但便后能自行回纳。III 期：便血量常减少，痔块脱出不能自行回纳，需用手托回。IV 期：痔块长期脱出于肛门外，或回纳后又即脱出。当痔块继发感染时局部有疼痛；若痔块脱出被痉挛的括约肌嵌顿时，疼痛明显。直肠指检常不能触及，肛门镜检查可见暗红色、质软的半球形肿物。

3. 【问题】T 管拔管指征？

【解答】拔管指征为黄疸消退，无腹痛、发热，大便颜色正常；胆汁引流量逐渐减少，颜色呈透明金黄色，无脓液、结石，无沉渣及絮状物，就可以考虑拔管。

4. 【问题】肢体抬高试验是什么？

【解答】肢体抬高试验：方法是让病人平卧，下肢抬高 45°，3 分钟后观察足部皮肤色泽变化。若出现足趾皮肤呈苍白或蜡黄色、自觉麻木疼痛，让病人坐起，下肢自然下垂于床沿，足部皮肤出现潮红或发绀者为阳性。有严重供血不足的肢体，常出现以上表现。

5. 【问题】尿失禁分为哪几种类型？

【解答】包括四种类型：

(1) 真性尿失禁：又称完全性尿失禁，常见原因为外伤、手术、先天性疾病引起的膀胱颈和尿道括约肌受损。

(2) 压力性尿失禁：当腹压突然增加如咳嗽、喷嚏、大笑、突然起立时，尿液随意地流出。多见于经产妇。

(3) 充溢性尿失禁：又称假性尿失禁，指膀胱功能完全失去代偿，膀胱过度充盈，压力增高，而引起尿液不断溢出。见于各种原因所致慢性尿潴留。

(4) 急迫性尿失禁：严重的尿频、尿急而膀胱不受意识控制而发生的尿液排空，通常发生于膀胱的严重感染。

