

一、最佳选择题

1. 根据中医理论，“症”“证”“病”三者含义不同，下列表述中属于“证”的是

- A. 气虚血瘀
- B. 心悸气短
- C. 胸胁胀满
- D. 噎腐吞酸
- E. 胸痹

2. “无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”体现了

- A. 阴阳的消长平衡
- B. 阴阳的互根互用
- C. 阴阳的对立制约
- D. 阴阳的相互转化
- E. 以上均包括

3. 贯心脉而推动血液循环的气是

- A. 宗气
- B. 营气
- C. 元气
- D. 肾气
- E. 卫气

4. 可以调节十二经气血，称为“十二经脉之海”的是

- A. 督脉
- B. 任脉
- C. 带脉
- D. 十二正经
- E. 冲脉

5. 容易发生湿滞、水肿、痰饮、瘀血等病症的体质类型是

- A. 阴虚质
- B. 肝郁质

- C. 偏阳质
- D. 阴阳平和质
- E. 偏阴质
6. 突然受惊后出现精神不安，惊慌失措的表现为
- A. 气上的症状
- B. 气下的症状
- C. 气乱的症状
- D. 气结的症状
- E. 气消的症状
7. 中医诊断学认为辨别病变性质的纲领是
- A. 八纲辨证
- B. 表里辨证
- C. 阴阳辨证
- D. 寒热辨证
- E. 虚实辨证
8. “通因通用”适用于治疗
- A. 阳虚泄泻
- B. 气虚泄泻
- C. 脾虚泄泻
- D. 虚寒泄泻
- E. 食积泄泻
9. 风热感冒应采用的治法是
- A. 辛温宣肺解表
- B. 凉血养阴解表
- C. 清热宣肺解表
- D. 散风除湿解表
- E. 益气清热解表
10. 咳嗽气粗，痰黏，色白或黄，咽痛，声音嘶哑，舌边尖红，苔薄白或微黄，脉浮数，证属

A. 风热犯肺

B. 燥邪伤肺

C. 痰热壅肺

D. 肝火犯肺

E. 肺肾阴虚

11. 根据脏腑辨证理论，胃脘隐痛，大便溏薄，证属

A. 食滞胃痛

B. 脾胃虚寒

C. 肝气犯胃

D. 肝胃郁热

E. 外寒袭胃

12. 发热恶寒，无汗，身重疼痛，神疲倦怠。舌质淡，苔薄黄，脉弦细，证属

A. 眩晕

B. 阴暑

C. 阳暑

D. 盗汗

E. 自汗

13. 四君子汤可用于治疗

A. 气虚虚劳

B. 血虚虚劳

C. 阴虚虚劳

D. 阳虚虚劳

E. 阴阳两虚虚劳

14. 大便带血，滴血或喷射状出血，血色鲜红，或有肛门瘙痒。舌红，苔薄白或薄黄，脉浮数应选用以下哪个方剂治疗

A. 六味地黄丸

B. 凉血地黄汤

C. 六神丸

D. 四神丸

E. 犀角地黄汤

15. 经行或先或后，经量或多或少，色紫红有块，血行不畅，胸胁、乳房、少腹胀痛，情志不舒，心烦易怒，暖气食少，时欲叹息。舌质淡红，苔薄，脉弦应选用以下哪个方剂治疗

A. 四物汤

B. 固经丸

C. 四神汤

D. 逍遥散

E. 温经汤

16. 患者面色萎黄，形体消瘦，神疲肢倦，不思乳食，腹满喜按，大便腥臭，舌质淡，苔白腻，脉濡细而滑，宜选用的治疗方法是

A. 清热利湿止带

B. 消食导滞，和中健脾

C. 健脾助运，消食化滞

D. 温经暖宫止痛

E. 和脾助运

17. 可用于小儿流感、脑炎的藏成药方剂是

A. 六味安消散

B. 五味渣驯丸

C. 八味沉香散

D. 志嘎汗散

E. 五味麝香丸

18. 密杂吉学说包括几种异常的气质

A. 九种

B. 八种

C. 七种

D. 六种

E. 五种

19. 成年男性正常的血红蛋白范围应是

A. 90~110g/L

B. 110~150g/L

C. 120~160g/L

D. 140~180g/L

E. 170~200g/L

20. 常作为急性 HBV 感染的指标的是

A. HBsAg-IgM

B. 抗 HBs-IgM

C. HBeAg-IgG

D. 抗 HBe-IgM

E. 抗 HBe-IgG

21. 若患者用药后发生严重不良反应，执业药师应首选的应对措施是

A. 检查药品质量

B. 退药息事

C. 处置不良反应

D. 赔偿患者

E. 降价销售该药

22. 以下不符合处方审核的要求的是

A. 审核处方各项内容

B. 对于不适宜处方，告知医师，另其确认或重新开具

C. 发现严重不合理用药时，应拒绝调剂

D. 处方一般当日有效，特殊情况下，最长不得超过 2 天

E. 药师不得涂改医师处方的药味、剂量、处方旁注等内容

23. 紫参的正名是

A. 拳参

B. 党参

C. 北沙参

D. 南沙参

E. 丹参

24. 处方写番木鳖，应付

A. 马钱子

B. 山梔子

C. 番泻叶

D. 海南子

E. 木鳖子

25. 海螵蛸的别名是

A. 桑螵蛸

B. 乌贼

C. 乌贼骨

D. 墨斗鱼

E. 海蛤壳

26. 中药“十九畏”中硫黄畏

A. 石脂

B. 五灵脂

C. 巴豆

D. 郁金

E. 芒硝

27. 属于配伍禁忌的药物，不能装于一斗或上下药斗中

A. 芒硝与荆三棱

B. 菟丝子与苏子

C. 阿魏与鸡矢藤

D. 海龙与海马

E. 当归与独活

28. 下列药物中需用时捣碎的是

A. 苦杏仁

B. 土鳖虫

C. 山药

D. 天花粉

E. 细辛

29. 生千金子的内服量为

A. 1~2g

B. 2~5g

C. 3~15g

D. 10~20g

E. 20~25g

30. 下列饮片中最易吸潮变软发黏的是

A. 炒白术

B. 炙甘草

C. 煨葛根

D. 酒当归

E. 醋香附

31. 生石灰块的吸潮率可达

A. 5%~15%

B. 10%~20%

C. 20%~25%

D. 20%~30%

E. 25%~30%

32. 在合理用药的原则中，安全的含义首先是指

A. 使用有毒药物时，应考虑是否适当

B. 使用有毒药物时，应考虑选择合理剂量

C. 应考虑所选药物是否安全，是否会对患者造成不良反应

D. 应考虑用药出现不良反应后，是否另行选药

E. 应考虑用药后如出现意外，是否有相应的处理措施

33. 青霉素治疗细菌性肺炎宜联用的中药是

A. 连翘

B. 麻黄

- C. 白及
D. 黄柏
E. 黄连
34. 与四环素、呋喃唑酮等联用，治疗痢疾、细菌性腹泻有协同作用的是
- A. 黄芩
B. 黄连
C. 黄芪
D. 甘草
E. 白芍
35. 何种中药与灰黄霉素联用，可增强灰黄霉素的吸收而增强疗效
- A. 柴胡加龙骨牡蛎汤
B. 茵陈蒿汤
C. 葛根汤
D. 木防己汤
E. 苓桂术甘汤
36. 既含对乙酰氨基酚，又含马来酸氯苯那敏的中成药是
- A. 重感灵片
B. 抗病毒颗粒
C. 羚羊感冒片
D. 维 C 银翘片
E. 感冒清热颗粒
37. 老年人用药剂量应
- A. 首次服用剂量加倍
B. 首次服用剂量给足
C. 严格按说明书成人剂量服用
D. 从最大剂量服用
E. 从最小剂量服用
38. 含有萜类成分，能够引起能引起急性中毒性肝炎，出现转氨酶升高、黄疸、肝肿大的药物是

A. 苍耳子

B. 川楝子

C. 油桐子

D. 望江南子

E. 蓖麻子

39. 马钱子类中药一次服用即可致死的剂量为

A. 0.2mg

B. 0.5~1.0mg

C. 2~4mg

D. 5~10mg

E. 30mg

40. 苍耳子生品有小毒，入药时应

A. 炒黄

B. 炒焦

C. 蒲黄煨

D. 盐炙

E. 酒炙

二、配伍选择题

[41~42]

A. 通因通用

B. 塞因塞用

C. 热因热用

D. 扶阳益火

E. 滋阴壮水

41. “益火之源，以消阴翳”对应的治法是

42. “壮水之主，以制阳光”对应的治法是

[43~44]

A. 肺

B. 心

C. 肝

D. 脾

E. 肾

43. “生痰之源”是指

44. “贮痰之器”是指

[45~46]

A. 语言错乱，错后自知

B. 自言自语，见人则止

C. 语无伦次，笑骂不定

D. 胡言乱语，声高有力

E. 语言重复，声低断续

45. 患者谵语时，可表现为

46. 患者郑声时，可表现为

[47~49]

A. 阳明潮热

B. 气虚发热

C. 阴虚潮热

D. 骨蒸劳热

E. 湿温潮热

47. 每当午后或入夜即发热者属

48. 胃肠燥热内结所致者属

49. 午后热甚，身热不扬者属

[50~52]

A. 齿龈淡白

B. 牙齿蛀蚀

C. 齿龈青紫

D. 齿稀根露

E. 齿龈红肿

50. 肾虚可见

51. 血虚可见

52. 胃火可见

[53~56]

A. 参苓白术散

B. 杞菊地黄丸

C. 消渴平片

D. 附子理中丸

E. 生力胶囊

53. 消渴见烦渴引饮，消谷善饥，小便频数而多，尿浑而黄，形体消瘦，舌红苔薄黄，脉滑数，方用

54. 消渴见口渴引饮，能食与便溏并见，或饮食减少，精神不振，四肢乏力。舌淡，苔薄白而干，脉细弱无力，方用

55. 消渴见尿频量多，浊如膏脂，腰酸膝软，头晕耳鸣，多梦遗精，乏力肤燥，舌红少苔，脉细数，方用

56. 消渴见小便频数，手足心热，咽干舌燥，耳轮干枯，腰膝酸软，畏寒肢冷，舌淡苔白乏津，脉沉细无力，方用

[57~58]

A. 肾虚血少

B. 脾虚气滞

C. 肝郁血虚

D. 气滞血瘀

E. 阳虚内寒

57. 经期或经后小腹冷痛，喜按，得热则舒，经量少，经色暗淡，腰腿酸软，小便清长，证属

58. 经前或经期小腹胀痛，拒按，经量少，经色紫暗有块，血块排出后痛减，证属

[59~61]

A. 乌头汤

B. 半夏厚朴汤

C. 防风汤

D. 归脾汤

E. 薏苡仁汤

59. 症见肢体关节酸痛，游走不定，关节屈伸不利，可选用

60. 症见肢体关节酸痛，痛有定处，遇寒痛增，得温痛减，可选用

61. 症见肢体关节酸痛，重着，患处肿胀，痛有定处，手足沉重，可选用

[62~63]

A. 寒滞肝经

B. 气滞血瘀

C. 阴虚火旺

D. 脾肾虚损

E. 肝经郁热

62. 属于月经后期的原因有

63. 月经先期，多因

[64~66]

A. 郁金

B. 藜芦

C. 甘遂

D. 草乌

E. 三棱

64. 不宜与芒硝同用的药物是

65. 不宜与丁香同用的药物是

66. 不宜与甘草同用的药物是

[67~68]

A. 补骨脂

B. 马兜铃

C. 自然铜

D. 炮姜

E. 吴茱萸

67. 处方直接写药名（或制），需调配炮制品的是

68. 处方直接写药名（或炒或炙），需调配蜜炙品的是

[69~70]

A. 淡盐水

B. 姜汤

C. 米汤

D. 黄酒

E. 清茶

69. 内服大补阴丸宜用的药引是

70. 内服四神丸宜用的药引是

[71~74]

A. 0.03~0.06g

B. 0.05~0.1g

C. 0.3~0.6g

D. 1~2g

E. 0.5~1.5g

71. 生甘遂的内服量应控制在

72. 洋金花的内服量应控制在

73. 斑蝥的内服量应控制在

74. 雄黄的内服量应控制在

[75~79]

A. 绿豆

B. 细辛

C. 花椒

D. 冰片

E. 丹皮

75. 与人参对抗同贮的是

76. 与灯心草对抗同贮的是

77. 与蛤蚧对抗同贮的是

78. 与硼砂对抗同贮的是

79. 与泽泻对抗同贮的是

[80~81]

A. 益母草颗粒与妇血康颗粒

B. 妇科千金片与当归四物汤

C. 补中益气丸与金匱肾气丸

D. 大活络丸与蛇胆川贝液

E. 六应丸与胆乐胶囊

80. 因“十九畏”而不宜合用的中成药

81. 因“十八反”而不宜使用的中成药配伍是

[82~84]

A. 小青龙汤

B. 木防己汤

C. 柴胡桂枝汤

D. 六君子汤

E. 芍药甘草汤

82. 与西药抗癫痫药联用，可减少抗癫痫药的用量及肝损害、嗜睡等副作用的是

83. 与抗震颤麻痹药联用，可减轻其胃肠道副作用，但也可能影响其吸收、代谢和排泄的是

84. 与解痉药联用，在提高疗效的同时，还能消除腹胀、便秘等副作用的是

[85~88]

A. 补骨脂、菟丝子、肉苁蓉

B. 黄芪、太子参、白术

C. 人参、冬虫夏草

D. 山药、白扁豆、稻芽

E. 党参、当归、黄精

85. 平时易感冒，多汗属于气虚的儿童宜用

86. 面色苍白、神疲乏力、夜寐不安、舌质淡的儿童宜用

87. 生长发育迟缓、尿频、面色苍白、舌胖的儿童宜用

88. 消瘦、面色萎黄、厌食、大便稀溏的儿童宜用

[89~90]

A. 蟾酥中毒症状

B. 乌头类中毒症状

C. 黄药子中毒症状

D. 马钱子中毒症状

E. 雄黄中毒症状

89. 小金丸服用过量可引起

90. 疏风定痛丸服用过量可引起

三、综合分析选择题

[91~94]

患者，女，28 岁，乳房胀痛半年，左侧乳房有肿块，月经前增大明显，伴有胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦，苔薄黄，脉弦滑。根据病例回答以下问题。

91. 病名诊断为

A. 月经不调

B. 不寐

C. 乳癖

D. 郁证

E. 虚劳

92. 正确辨证应为

A. 肝郁痰凝

B. 冲任失调

C. 肝气郁结

D. 痰瘀互结

E. 肝郁化火

93. 宜采用的相应治法是

A. 温阳化痰，疏肝解郁

- B. 疏肝解郁，理气畅中
- C. 健脾养心，补益气血
- D. 疏肝理气，活血化瘀
- E. 疏肝理气，化痰消坚

94. 治疗宜选用

- A. 消核片
- B. 二仙汤和四物汤
- C. 牛黄醒消丸
- D. 逍遥萎贝散加减
- E. 柴胡厚朴汤加减

[95~98]

患者鼻塞，涕黄稠而量多，嗅觉差，鼻黏膜红肿，伴头痛，发热，汗出，胸闷。舌红苔黄，脉浮数。

95. 患者应被诊断为

- A. 口疮
- B. 外感
- C. 咽喉肿痛
- D. 鼻渊
- E. 喘证

96. 患者的辨证当属

- A. 肝火上炎
- B. 冲任失调
- C. 痰凝气滞
- D. 胆经有热
- E. 风热蕴肺

97. 对于该患者应采用的治疗方法是

- A. 宣肺散寒
- B. 补肾纳气
- C. 豁痰化瘀

D. 疏散风寒，宣肺解表

E. 祛风清热宣窍

98. 治疗选方为

A. 逍遥萎贝散

B. 泻白散合辛夷清肺饮

C. 二仙汤

D. 防风通圣散

E. 四物汤

[99~100]

男性，48 岁，病起 5 日，恶寒发热，身热显著，发热较重，鼻塞流涕，少汗身痛，咳嗽气急，痰稠色黄，咽痛咽红，苔薄黄、舌边尖红，脉浮数。

99. 此患者辨证当属

A. 风寒感冒

B. 风热感冒

C. 暑湿感冒

D. 时行感冒

E. 体虚感冒

100. 此患者可选用的中成药有

A. 银翘解毒丸

B. 荆防败毒散

C. 清瘟解毒丸

D. 二母宁嗽丸

E. 参苏饮

[101~102]

女性，49 岁，肥胖，胸闷胸痛，痰多，食欲不振，肢体有沉重感，苔浊腻，脉结、代。

101. 对此患者应采取的治疗方法为

A. 益气活血

B. 活血行气

C. 温中散寒

D. 豁痰化瘀

E. 益气养阴

102. 医生可运用何方治疗

A. 补阳还五汤

B. 血府逐瘀汤

C. 生脉散

D. 乌头赤石脂丸

E. 瓜蒌薤白半夏汤合丹参饮

[103~106]

患者被诊断为高血压，医生开具珍菊降压片进行治疗

103. 下列与珍菊降压片不存在使用禁忌的中成药的是

A. 山海丹

B. 活心丹

C. 心宝丸

D. 杞菊地黄丸

E. 益心丸

104. 珍菊降压片所含有的西药组分是

A. 氢氯噻嗪

B. 氢氯噻吩

C. 格列苯脲

D. 马来酸氯苯那敏

E. 咖啡因

105. 珍菊降压片与西药盐酸可乐定配伍使用，属于

A. 扩大适用范围

B. 减少剂量

C. 降低毒副反应

D. 协同增效

E. 中西药的不合理应用

106. 不能与珍菊降压片联用的中成药是

- A. 含有朱砂的中成药
- B. 含有郁金的中成药
- C. 含有丁香的中成药
- D. 含有藿香的中成药
- E. 含有麻黄的中成药

[107~110]

患者 2 岁半，平日易感冒，消瘦、厌食、大便溏薄

107. 针对患者的易感症状，宜选用的中药有

- A. 黄芪
- B. 黄连
- C. 黄芩
- D. 黄柏
- E. 大黄

108. 针对患者消瘦、厌食、大便溏薄的症状，可以选择的中药有

- A. 鹿茸
- B. 人参
- C. 大黄
- D. 山药
- E. 生地

109. 下列不属于婴幼儿合理应用中药的原则的是

- A. 用药及时
- B. 用量宜轻
- C. 虚则大补
- D. 宜佐以凉肝定惊之品
- E. 宜佐以健脾和胃之品

110. 婴幼儿患者应用中药的注意事项不包括

- A. 小儿感冒后出现舌苔厚腻，口有异味，大便秘结时，绝不能给予滋补药。
- B. 生长发育旺盛的儿童不过多服用含有激素的食品或补品

- C. 体虚夹湿，伴有便秘者，不可应用黄连、黄芩、陈皮这些中药。
- D. 如果患儿面色苍白、神疲乏力、夜寐不安、舌质淡，属于气血两虚的儿童，可给予益气养血的黄芪、党参、当归等
- E. 儿童生长发育迟缓，尿频，面色苍白，舌胖，属于肾虚，宜用补肾的补骨脂、菟丝子、肉苁蓉等

四、多项选择题

111. 根据五行相克规律确定的治法有
- A. 益火培土
 - B. 泻南补北
 - C. 佐金平木
 - D. 抑木扶土
 - E. 补脾益肺
112. “土爰稼穡”是指土具有
- A. 生化作用
 - B. 收敛作用
 - C. 滋润作用
 - D. 受纳作用
 - E. 承载作用
113. 喘咳气涌，胸部胀痛，痰稠黏色黄，或夹血痰，伴胸中烦闷，身热，有汗，口渴喜冷饮，咽干，面红，尿赤，便秘。可用以下哪些治疗
- A. 清肺化痰丸
 - B. 清肺消炎丸
 - C. 蛇胆川贝枇杷膏
 - D. 养阴清肺丸
 - E. 百合固金丸
114. 肝胃郁热型胃痛可选用的中成药是
- A. 左金丸
 - B. 加味左金丸
 - C. 温胃舒胶囊

D. 胃逆康胶囊

E. 黄芪健胃膏

115. 含麻黄的中成药忌与哪些中成药并用

A. 复方罗布麻片

B. 通宣理肺丸

C. 牛黄降压丸

D. 速效救心丸

E. 珍菊降压片

116. 维 C 银翘片中含有的西药成分包括

A. 对乙酰氨基酚

B. 马来酸氯苯那敏

C. 咖啡因

D. 维生素 C

E. 异戊巴比妥

117. 婴幼儿患者合理使用中药的原则

A. 不宜随便施补

B. 用量宜轻

C. 多宜温补

D. 宜用轻清之品

E. 尤宜兼顾健脾和胃

118. 以下哪项属于引起的中药不良反应的药物和使用因素

A. 炮制不当

B. 剂量过大

C. 疗程过长

D. 辨证不准

E. 配伍失度

119. 老年慢性支气管炎出现肺阴虚象，宜使用

A. 沙参

B. 红参

C. 黄芪

D. 生地

E. 西洋参

120. 含对乙酰氨基酚成分的中药在服用时应注意

A. 不能与巴比妥类西药合用，可引起肝毒性

B. 长期大量应用可引起急性肾功能衰竭，

C. 服用过量可引起低血糖

D. 服药期间不得从事驾驶车辆、登高作业等工作

E. 孕妇禁用