

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2020 年第 33 期

1. 【问题】何种腹腔内脏损伤检查时腹膜刺激征不明显

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 胰破裂
- D. 肠穿孔
- E. 胃穿孔

【正确答案】B

【继续提问】为什不选择 A。

【解答】完全性肝破裂表现为出血性休克，因血液、胆汁流入腹腔、腹膜刺激症较明显，有腹痛、腹肌紧张、压痛、反跳痛；有移动性浊音，肠鸣音消失，腹穿可抽出混有胆汁的血液。

2. 【问题】肺结核患者在必要时给镇静镇咳药物怎么是正确的呢？

【解答】咯血病人的护理：

(1) 止血药物：咯血量较大者常用垂体后叶素 5~10U 加入 25%葡萄糖注射液 40ml 缓慢静脉推注，或继续用垂体后叶素加入 5%葡萄糖注射液按 0.1U/(kg·h) 的速度静脉滴注。但该软件有收缩血管和子宫平滑肌的作用，因此冠心病、高血压及妊娠者禁用。

(2) 镇静剂：对烦躁不安者可用镇静剂，如地西洋 5~10mg 肌注。禁用吗啡、哌替啶，以免抑制呼吸。

(3) 镇咳剂：咯血伴剧烈咳嗽时可用镇咳剂，必要时可用可待因口服或皮下注射，但年老体弱、肺功能不全者慎用。

3. 【问题】老师，内科学时讲的不是左肺，右体吗？左循环肺，右循环体，我又给搞混了？

【解答】左心衰时肺循环淤血，右心衰时体循环淤血，简称左肺右体。
体循环的路线为：左心室→主动脉→全身各级动脉→全身各处毛细血管→全身各级静脉→上、下腔静脉→右心房。

肺循环的路线为：右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房。

所以，体循环和肺循环的起始部位分别是左心室，右心室。