

《中药学综合知识与技能》100 考点+例题

考点 1. 患者合理用药教育-服药温度

不同的中药有不同的服用方法，需要向患者进行用药宣教。针对服药温度，需告知患者的内容有：

服药温度	适宜药物	举例
温服	一般汤剂	当归四逆汤 乳香、没药、瓜蒌仁等对胃肠道有刺激性的药物
	解表药	桂枝汤、麻黄汤
热服	寒证药	治疗寒证的药物，多为热药，需热服。 注意：真热假寒证，应寒药热服
	热证药	治疗热证用寒药宜冷服。玉女煎清胃滋阴，治疗热证，宜冷服 注意：真寒假热证，应热药冷服
冷服	解毒药	中毒患者服用热药，易促进毒药扩散，宜冷服
	止吐药	-
	清热祛暑药	-
	其他	-

最佳选择题

玉女煎可清胃滋阴，治疗阴虚燥热证，在使用时宜

- A. 寒药冷服
- B. 寒药温服
- C. 热药热服
- D. 热药温服
- E. 热药冷服

【答案】A

考点 2. 应用药品需特别提示的情形

患者在应用药品时，执业药师需特殊提示的情形有：

- (1) 患者同时使用 2 种或 2 种以上含同一成分的药品时；或合并用药较多时。
- (2) 当患者用药后出现不良反应时；或既往有曾发生过不良反应史。
- (3) 当患者依从性不好时；或患者认为疗效不理想时或剂量不足以有效时。

- (4) 病情需要, 处方中配药剂量超过规定剂量时 (需医师双签字)。处方中用法用量与说明书不一致时。或非药品说明书中所指示的用法、用量、适应证时。
- (5) 超越说明书范围的适应证或超过说明书范围的使用剂量 (需医师双签字确认)。
- (6) 患者正在使用的药物中有配伍禁忌或配伍不当时 (如有明显配伍禁忌时应第一时间联系该医师以避免纠纷的发生)。
- (7) 第一次使用该药的患者。
- (8) 近期药品说明书有修改 (如商品名、适应证、剂量、有效期、贮存条件、药品不良反应)。
- (9) 患者所用的药品近期发现严重或罕见的不良反应。
- (10) 使用含有毒中药或有毒成份药品的患者。
- (11) 同一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大或剂量接近阈值时。
- (12) 药品被重新分装, 而包装的标识物不清晰时。
- (13) 使用需特殊贮存条件的药品时; 或使用临近有效期药品时。

### 最佳选择题

需要执业药师特别提醒的特殊情况是

- A. 患者购买贵重药品时
- B. 患者购买非处方中成药时
- C. 患者购买的药品近期发现有严重不良反应时
- D. 患者购买长期维持治疗的药品时
- E. 患者购买按疗程治疗的药品时

【答案】C

### 考点 3. 阴阳的相互关系

阴阳的相互关系	概念
阴阳的对立制约	又称“阴阳对待” 对立: 阴阳相反 制约: 相互抑制
阴阳的互根互用	又称“阴阳互藏” 互根: 相互依存 互用: 相互资生、相互促进

阴阳的消长平衡	动态平衡（量变）
阴阳的相互转化	阴可转化为阳，阳可转化为阴（质变）

### 最佳选择题

“动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”体现阴阳的相互关系是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 相互交感
- D. 消长平衡
- E. 相互转化

【答案】A

### 考点 4. 人体中的五行

人体中的五行	五脏	五腑	五官（五窍）	五体	五志	五声	五华	五液	藏神	变动
木	肝	胆	目	筋	怒	呼	爪	泪	魂	握
火	心	小肠	舌	脉	喜	笑	面	汗	神	忧
土	脾	胃	口	肉	思	歌	唇	涎	意	哕
金	肺	大肠	鼻	皮	悲	哭	毛	涕	魄	咳
水	肾	膀胱	耳	骨	恐	呻	发	唾	志	栗

### 多项选择题

下列属于“火”行的是

- A. 筋
- B. 舌
- C. 喜
- D. 苦
- E. 笑

【答案】BCDE

### 考点 5. 五行学说在疾病治疗中的应用

关系	治则	治法	适用病证
根据相生规	虚则补其	滋水涵木法（滋肾）	头目眩晕，眼目干涩，颧红耳鸣，五心烦

律确定的治 则治法	母, 实则泻 其子	养肝法)	热, 腰膝酸软, 男子遗精, 女子月经不调, 舌红少苔, 脉弦细而数
		益火补土法 (温肾 健脾法)	畏寒肢冷, 腰膝冷痛, 腹泻, 完谷不化, 或五更泄泻, 舌淡胖边有齿痕, 苔白滑, 脉沉无力
		培土生金法 (补养 脾肺法)	久咳, 痰多清稀, 食欲减退, 大便溏薄, 四肢无力, 舌淡脉弱
		金水相生法 (滋养 肺肾法)	咳嗽气逆, 干咳少痰或咳血, 音哑, 潮热 盗汗, 腰膝酸软, 遗精, 体瘦, 口干, 舌 红少苔, 脉细数等症
根据相克规 律确定的治 则治法	抑强, 扶弱	抑木扶土法 (疏肝 健脾法)	木旺乘土或土虚木乘之证
		培土制水法 (敦土 利水法)	脾虚不运, 水湿泛滥而致水肿胀满
		佐金平木法 (滋肺 清肝法)	肝火太盛, 耗伤肺阴的肝火犯肺
		泻南补北法 (泻火 补水法)	肾阴不足, 心火偏旺, 水火不济, 心肾不 交之证

### 多项选择题

下列治法中根据五行相生规律确定的治法有

- A. 培土生金法
- B. 金水相生法
- C. 滋水涵木法
- D. 益火补土法
- E. 培土制水法

【答案】 ABCD

### 考点 6. 肾的生理功能

五脏	生理功能	具体内容
肾	肾藏精, 主生	肾主生长、发育:

长、发育与生殖	<p>(1) 青壮年时期, 肾中精气逐步旺盛, 精神饱满, 筋骨劲强, 肌肉强壮, 牙齿坚固, 头发黑亮</p> <p>(2) 待到老年, 肾中精气逐渐衰减, 人体逐渐衰老, 发鬓斑白, 牙齿动摇, 耳聋失聪, 面憔无华</p>
	<p>肾主生殖:</p> <p>(1) 肾藏先天之精, 其携带遗传物质, 促进入体胚胎发育, 是生命起源的物质基础</p> <p>(2) 肾精能化生“天癸”。所谓“天癸”, 是随着肾中精气不断充盈, 所产生的具有促进入体生殖器官发育成熟和维持人体生殖功能作用的精微物质</p>
	<p>肾中阴阳为各脏腑阴阳之根本</p>
肾主水	<p>主宰全身水液代谢: 肾气对参与津液代谢的其他脏腑如肺、脾、肝、三焦等具有促进和调节作用</p>
	<p>生成尿液: 肾之阳气的蒸腾气化, 使水液中清者上升, 浊者下降。清者形成津液, 重新布散周身。浊者形成尿液, 注于膀胱而为尿</p>
肾主纳气	<p>肾有摄纳肺所吸入的清气, 保持吸气的深度, 防止呼吸表浅。“肺为气之主, 肾为气之根”</p>

### 最佳选择题

对维持呼吸深度起重要作用的脏是

- A. 肝
- B. 肺
- C. 肾
- D. 脾
- E. 心

【答案】C

### 考点 7. 气的分类

名称	各自的生理功能
元气	<p>是人体最基本、最重要的气, 是人体生命活动的原动力</p> <p>元气的生理功能: 推动促进人体生长发育, 温煦和激发各脏腑、经络等组织器官</p>

	的生理活动
宗气	宗气，是积于胸中之气 宗气在胸中集聚之处，称作“气海”，又称“膻中” 宗气的生理功能：上走息道以行呼吸，贯注心脉以行气血
营气	营气的生理功能：营养人体，化生血液
卫气	卫气活动力特别强，流动迅速，不受脉管的约束 卫气的生理功能：护卫肌表，防御外邪入侵；温养脏腑、肌肉、皮毛；调节控制汗孔的开合和汗液的排泄，维持体温的相对恒定

### 最佳选择题

活动力特别强，流动迅速的气是

- A. 真气
- B. 元气
- C. 宗气
- D. 营气
- E. 卫气

【答案】E

### 考点 8. 气的生理功能

气的功能	具体内容
推动作用	气的推动作用减弱，则影响生长发育，甚至出现早衰；使脏腑组织器官、经络等功能减退；或使血液、津液的生成不足，运行滞缓，而发生血虚、血行不利或水液在体内滞留等病变
温煦作用	人体体温的恒定，依赖气的温煦和调节； 各脏腑组织器官、经络等，也要在气的温煦作用下，才能进行正常的生理活动； 血和津液之所以能保持液态在体内不停地运行，除依赖于气的推动外，也要依靠气的温煦作用，方不致凝聚。“血得温则行，得寒则凝”
防御作用	一是护卫肌表，防止外邪侵入 二是与侵入体内的各种邪气进行斗争

固摄作用	固摄血液，即维持血液在脉管内循行，防止逸出脉外； 固摄汗液、尿液、唾液、胃液、肠液等正常物质分泌和排泄，防止其无故外泄和流失，从而维持体内水液代谢的相对平衡； 维持脏腑器官位置的稳定，使之保持正常的生理活动和脏腑之间功能的相互协调； 维持胎儿在胞宫内的安定和正常发育等
气化作用	实际上就是体内物质代谢的过程，即物质转化和能量转化的过程

### 最佳选择题

某女性患者，产后经常感冒，体倦乏力。该病主要应属哪种气的功能失调

- A. 宗气
- B. 营气
- C. 卫气
- D. 元气
- E. 中气

【答案】C

【解析】卫气具有护卫肌表，防御外邪入侵和调节控制汗孔的开合和汗液的排泄，以维持体温的恒定的功能，通过患者“易于感冒”可以说明，卫气的功能失调。

### 考点 9. 体质的分类

体质类型	形体结构	生理特点	受邪多发病
偏阳质	形体适中或偏瘦，但较结实	代谢相对亢奋、身体偏热、多动、好兴奋、畏热喜冷、食量大	外感发病多表现为热证、实证
偏阴质	形体适中或偏胖，但肌肉不壮	代谢相对抑制、身体偏寒、喜静少动、畏寒喜热、食量小	外感发病多表现为寒证、虚证
阴阳平和质	胖瘦适度，体形匀称健壮	正常有度	不易感受外邪，平素患病较少，即使患病，易于治愈，康复较快

### 最佳选择题

体质偏阳者，受邪发病后，多表现为

- A. 寒证、虚证

- B. 寒证、实证
- C. 热证、虚证
- D. 热证、实证
- E. 里证、寒证

【答案】D

#### 考点 10. 疠气的发病特点

疠气：比如今年全球爆发的新型冠状病毒肺炎，即为一种“疠气”。

疠气的致病特点：

- (1) 发病急骤、病情较重；
- (2) 一气一病、症状相似；
- (3) 传染性强、易于流行。

#### 多项选择题

疠气，即疫疠邪气，是一类具有强烈传染性的外感致病邪气，又称“戾气”、“异气”、“毒气”、“乖戾之气”等。其致病特点是

- A. 发病急骤
- B. 病情较重
- C. 一气多病
- D. 传染性强
- E. 易于流行

【答案】ABDE

#### 考点 11. 毒邪的致病特点

病因	形成原因	致病特点
毒邪	1. 外来之毒：自然界，多为天时不正之气所感 2. 内生之毒：饮食失宜、七情内伤、痰饮瘀血，治疗不当等；或脏腑功能失调，毒邪郁积所致，具有内生毒邪和病理产物性病因的特点	毒性强烈，损脏伤形
		致病广泛，复杂多变
		症状秽浊，顽固难愈

#### 最佳选择题

以下关于毒邪的致病特点, 说法正确的有

- A. 中毒
- B. 毒性强烈, 损脏伤形
- C. 致病广泛, 复杂多变
- D. 症状秽浊, 顽固难愈
- E. 加重病情, 变生他疾

【答案】BCD

考点 12. 虚实夹杂证的分类与临床表现

邪正盛衰的病机	具体分类	临床表现
虚实夹杂	实中夹虚: 以邪实为主, 兼见正气虚损	外感热病发展过程中, 由于邪热炽盛, 消灼津液而形成的实热伤津、气阴两伤病证, 出现高热、烦渴欲饮、尿少便干等表现, 就属于实中夹虚
	虚中夹实: 以正虚为主, 兼夹邪实	脾阳不振, 运化无权之水肿病, 即为虚中夹实

最佳选择题

由于脾阳不振运化无权, 而致湿邪内生, 出现水肿, 其病机是

- A. 真实假虚
- B. 真虚假实
- C. 虚中夹实
- D. 由实转虚
- E. 实中夹虚

【答案】C

考点 13. 阴阳盛衰的病机

阴阳		病机	临床表现
阴阳偏盛	阴偏盛	阴盛则寒, 即为实寒证	寒象, 比如形寒、肢冷、舌淡
	阳偏盛	阳盛则热, 即为实热证	热象, 比如壮热、面红、目赤
阴阳偏衰	阴偏衰	阴虚则热, 即为虚热证	五心烦热、骨蒸潮热、颧红消瘦、盗汗、咽干口渴、舌红少苔, 脉细数无力
	阳偏衰	虚寒证	面色白、畏寒肢冷、舌淡、脉迟; 喜静蹇

		卧、小便清长、下利清谷
--	--	-------------

### 最佳选择题

以下不属于阴偏盛的病理变化的是

- A. 真寒假热
- B. 阴盛格阳
- C. 阴胜则寒
- D. 虚寒证
- E. 阴盛则阳病

【答案】D

【解析】阳虚则寒，病机为虚寒证。所以虚寒证是阳偏衰的病理变化。

### 考点 14. 气失调的病机

失调	具体方面	病机或症状
气失调	气虚	气虚，比如心气虚、肺气虚、脾气虚，元气不足，宗气不足，营气不足，卫气不足
	气机失调	即为气行失常，包括气滞、气逆、气陷、气闭和气脱等

### 多项选择题

气机失调的病机包括

- A. 气闭
- B. 气陷
- C. 气滞
- D. 气逆
- E. 气脱

【答案】ABCDE

### 考点 15. 八纲与辨证的关系

八纲：指阴阳、表里、寒热、虚实八个辨证要点，也是辨证的纲领。

- (1) 寒热用以分辨疾病属性。
- (2) 表里用以分辨疾病病位与病势的浅深。
- (3) 虚实用以分辨邪正的盛衰。
- (4) 疾病的基础是阴阳失调，阴阳是区分疾病类别的总纲。

最佳选择题

中医诊断用以分辨病位与病势深浅的纲领是

- A. 阴阳
- B. 表里
- C. 寒热
- D. 虚实
- E. 气血

【答案】B

考点 16. 望诊-望神-神乱

望神	表现	病机
神乱	表情淡漠，寡言少语，闷闷不乐，继则精神发呆，哭笑无常	痰气凝结、阻蔽心神-癫病
	烦躁不宁，登高而歌，弃衣而走，呼号怒骂，打人毁物，不避亲疏	痰火扰心-狂病
	若突然跌仆，昏不知人，口吐涎沫，四肢抽动	痰迷心窍、肝风内动-痫病

最佳选择题

癫病的临床表现是

- A. 两眼灵活，监识精明
- B. 循衣摸床，撮空理线
- C. 面色晦暗，忽然如妆
- D. 表情淡漠，寡言少语
- E. 登高而歌，呼号怒骂

【答案】D

考点 17. 望诊-望唇

名称	症状	可能的证型
望唇	唇色淡白	气血两虚
	唇色青紫	寒凝血瘀
	唇色深红	热入营血
	口唇干枯皴裂	外感燥邪、热炽津伤

口角流涎	脾虚湿盛、胃中有热、虫积
口唇糜烂	肺胃蕴热上蒸
口喎斜	中风
撮口或抽掣不停	肝风内动
口开不闭	脱证

### 最佳选择题

唇色淡白，多见于

- A. 气血两虚
- B. 寒凝血瘀
- C. 热入营血
- D. 脾虚湿盛
- E. 肝风内风

【答案】A

【解析】唇色淡白，多属气血两虚。

### 考点 18. 望诊-望舌形

舌形	舌形状态	证候
荣枯舌	荣舌舌体明润	津液充足
	枯舌舌体干瘪	津液已伤
老嫩舌	老舌形色坚敛苍老	实证、热证
	嫩舌纹理细腻，形色浮胖娇嫩	虚证、寒证
胖大舌	胖嫩舌，舌体胖嫩，色淡	脾肾阳虚，津液不化，水饮痰湿阻滞
	肿胀舌，舌体肿胀满口，色深红	心脾热盛
	胖肿舌，色青紫而暗	中毒
瘦薄舌	瘦薄而色淡	气血两虚
	瘦薄而色红绛且干	阴虚火旺、津液耗伤
裂纹舌	舌质红绛而有裂纹	热盛津伤、阴精亏损
	舌色淡白而有裂纹	血虚不润
齿痕舌	舌体的边缘见牙齿的痕迹	多因舌体胖大而受齿缘压迫所致，故齿痕舌常与胖大舌同见，多属脾虚

	舌质淡白而湿润	脾虚而寒湿壅盛
芒刺舌	芒刺干燥	热邪亢盛, 且热愈盛则芒刺愈多
	舌尖有芒刺	心火亢盛
	舌边有芒刺	肝胆火盛
	舌中有芒刺	胃肠热盛

### 1. 最佳选择题

邪热亢盛可见的舌象是

- A. 歪斜舌
- B. 裂纹舌
- C. 瘦薄舌
- D. 胖大舌
- E. 芒刺舌

【答案】E

【解析】芒刺干燥, 多属热邪亢盛, 且热愈盛则芒刺愈多。

### 考点 19. 闻诊-语声变化

闻诊的内容	症状	证候
语声变化	语声高亢洪亮、多言而躁动	实证、热证
	语声低微无力, 少言而沉静	虚证、寒证
	语声重浊	湿浊阻滞
语言错乱	神识昏糊, 胡言乱语, 声高有力, 为谵语	热扰心神的实证
	神志不清, 语言重复, 时断时续, 声音低弱, 为郑声	心气大伤, 精神散乱的虚证
	言语粗鲁, 狂妄叫骂, 失去理智控制, 为狂言	痰火扰心的狂证
	喃喃自语, 讲话无对象, 见人便停止, 为独语	心气虚, 精不养神的癫证
	语言謇涩	风痰上扰

### 最佳选择题

神志不清, 语言重复, 语声低弱, 为

- A. 谵语
- B. 郑声
- C. 独语
- D. 错语
- E. 狂言

【答案】B

【解析】神志不清，语言重复，时断时续，声音低弱的，为郑声。属于心气大伤，精神散乱的虚证。

考点 20. 问诊-问寒热-但热不寒

寒热类型		临床表现	临床意义
但热不寒	壮热	高热不退、不恶寒反恶热，口大渴，汗大出，脉洪大	里实热证
	潮热	阴虚潮热：午后或入夜发热，五心烦热，“骨蒸潮热”，盗汗、颧赤、口咽干燥、舌红少津	阴虚证
		湿温潮热：午后热甚、身热不扬，多见胸闷呕恶、头身困重、大便溏薄、苔腻	湿温证
		阳明潮热：常于日晡阳明旺时而热甚，又称“日晡潮热”，兼见腹满痛拒按、大便燥结、手足汗出、舌苔黄燥	阳明腑实证
	长期低热	发热日期较长，热度仅较正常体温稍高（不超过 38℃）	阴虚内热，气虚发热

最佳选择题

患者常于日晡时而热甚，常兼见腹满痛拒按，大便燥结，手足汗出，舌苔黄燥，甚则生芒刺等症，其临床意义是

- A. 湿温潮热
- B. 气虚发热
- C. 阳盛阴虚
- D. 阴虚发热
- E. 阳明潮热

【答案】E

【解析】阳明潮热：是由于胃肠燥热内结所致，因其常于日晡阳明旺时而热甚，故又称“日晡潮热”，常兼见腹满痛拒按，大便燥结，手足汗出，舌苔黄燥、甚则生芒刺等症。

考点 21. 切诊-主要病脉的脉象和主病

名称	脉象	主病
浮脉	轻取即得，重按稍弱	表证
沉脉	轻取不应，重按始得	里证
数脉	一息五至以上，“去来促急”	热证
迟脉	一息不足四至，脉来迟缓	寒证
虚脉	三部脉举按皆无力	虚证
实脉	三部脉举按皆坚实有力	实证
滑脉	“往来流利，如盘走珠”，有圆滑感	痰饮、食滞、实热，妊娠也可见滑脉
涩脉	往来艰涩不畅，有如轻刀刮竹	气滞、血瘀、精伤、血少
细脉	脉来细小如线，软弱无力，应指明显	气血两虚，主湿病
濡脉	浮而细软，轻按可触之，重按反不明显	虚证、湿证
微脉	极细而软，按之欲绝，若有若无	心肾阳衰、暴脱
弱脉	沉细而应指无力	气血两虚
洪脉	脉体阔大，充实有力，来盛去衰	邪热亢盛
弦脉	端直以长，如按琴弦	肝胆病、痛证、痰饮
代脉	脉来缓弱而有规则的歇止，良久方来	脏气衰微，风证、痛证、七情惊恐、跌仆损伤

最佳选择题

脉数主病是

- A. 虚证
- B. 热证
- C. 阴证
- D. 寒证
- E. 表证

【答案】B

【解析】数脉主热证。

### 考点 22. 表证与里证的临床表现区别点

(一) 表证、里证的临床表现

表里	临床表现
表证	发热恶寒，或恶风，舌苔薄白，脉浮
里证	里证包括的范围极广，除去表证，即为里证

(二) 表证、里证的区别

证型	发热是否恶寒	舌苔是白是黄	脉象是浮是沉
表证	发热恶寒同时并见	苔薄	脉浮
里证	发热与恶寒不会同时出现	苔厚	脉沉

### 最佳选择题

表证与里证最主要的鉴别要点是

- A. 表证为新病，里证为久病
- B. 表证较轻，里证较重
- C. 表证起病急，里证起病缓
- D. 表证寒热并见，里证但寒不热或但热不寒
- E. 表征脉多浮数，里证脉多沉迟

【答案】E

【解析】表证与里证的鉴别：以辨别热性病的表证和里证，要辨清发热是否伴有恶寒，舌苔是白是黄，脉象是浮是沉。从临床表现上分析，一般以发热恶寒、苔薄白、脉浮，属表证；发热不恶寒、苔黄、脉数或沉滑，属里证。

### 考点 23. 肾病主要证候

肾病主要证候	症状表现
肾阳虚	形寒肢冷，精神不振，腰膝酸软，或阳痿不举。舌淡苔白，脉沉迟或两尺无力
肾阴虚	头晕目眩，耳鸣耳聋，牙齿松动，失眠遗精，口燥咽干，五心烦热，盗汗，腰膝酸痛。舌红，脉细数
肾精不足	男子精少不育，女子经闭不孕，性功能减退。小儿发育迟缓，身材矮小，智力

	和动作迟钝，凶门迟闭，骨骼痿软。成人早衰，发脱齿摇，耳鸣耳聋，健忘恍惚，动作迟缓，足痿无力，精神呆钝
肾气不固	滑精早泄，尿后余沥，小便频数而清，甚则不禁，腰脊酸软，面色淡白，听力减退，舌淡苔白，脉细弱
肾不纳气	气虚喘促，呼多吸少，动则喘甚，汗出，四肢不温，恶寒风，面部虚浮，脉虚浮，舌质淡

**最佳选择题**

某男，85岁。动作迟缓，健忘恍惚，腰膝酸软，头晕耳鸣，齿摇发脱，舌淡红，苔白，脉沉无力。根据辨证要点分析，该患者的证候是

- A. 肾精不足
- B. 脑髓亏虚
- C. 心肝两虚
- D. 心肝血虚
- E. 脾气不足

【答案】A

**考点 24. 胃部疾病的主要证候与临床表现**

证型	临床表现
胃寒证	胃脘疼痛，轻则绵绵不已，重则拘急剧痛，阵阵发作，遇寒则重，得热则缓，呕吐清水，舌苔白滑，脉沉迟或沉弦
胃热（火）证	胃脘灼热而疼痛，烦渴多饮或渴欲冷饮，消谷善饥，牙龈肿痛，口臭，泛酸嘈杂，舌红苔黄，脉滑数
食滞胃脘证	脘腹胀满，呕吐酸腐，嗝气反酸，或矢气酸臭，不思饮食，大便泄泻或秘结。舌苔厚腻，脉滑
胃阴虚证	口咽发干，多以睡后明显，不思饮食，或知饥不食，并有心烦、低热、大便不调、干呕作呃，舌红少苔或无苔，脉细数

**最佳选择题**

腹痛下利，里急后重，多为

- A. 膀胱湿热证
- B. 大肠液亏证

- C. 大肠湿热证
- D. 食滞胃脘证
- E. 寒滞肝脉证

【答案】C

考点 25. 与心相关的脏腑相兼病证的主要证候

证型	临床表现	症状分析
心肺两虚证	久咳不已，气短心悸，面色白，甚者可 见口唇青紫。舌淡，脉细弱	久咳-定位在肺 心悸-定位在心
心脾两虚证	心悸怔忡，失眠多梦，健忘，食纳减少， 腹胀，大便溏泻，倦怠乏力，舌质淡嫩， 脉细弱	心悸怔忡，失眠多梦-定位在心 食纳减少，腹胀，溏泻-定位在脾 倦怠乏力-气虚
心肾不交证	虚烦失眠，心悸健忘，头晕耳鸣，咽干， 腰膝酸软，多梦遗精，潮热盗汗，小便 短赤。舌红无苔，脉细数	失眠，心悸健忘-心火旺 腰膝酸软，多梦遗精，潮热盗汗-肾 阴不足

最佳选择题

临床表现为虚烦心悸，失眠健忘，头晕耳鸣，舌淡脉细，腰膝酸软，多梦遗精。辨证其证候是

- A. 心脾两虚证
- B. 心阳虚证
- C. 心肝血虚证
- D. 心阴虚证
- E. 心肾不交证

【答案】E

考点 26. 气病主要证候的临床表现

证型	临床表现
气虚	头晕目眩，少气懒言，疲倦乏力，自汗，活动时诸症加剧。舌淡，脉虚无力
气陷	头目昏花，少气倦怠，腹部有坠胀感，脱肛或子宫脱垂等。舌淡苔白，脉弱
气滞	胀闷疼痛，妇女乳房胀痛
气逆	肺气上逆可见咳嗽喘息

	胃气上逆，则见呃逆，暖气，恶心呕吐
	肝气升发太过，则现头痛，眩晕，昏厥，呕血

**最佳选择题**

某女，35岁。胸胁、乳房、少腹胀闷窜痛，善太息，辨析其证候是

- A. 气虚证
- B. 气滞证
- C. 气脱证
- D. 气闭证
- E. 气陷证

**【答案】** B

**考点 27. 血病主要证候的临床表现**

血病证候	主要典型症状
血虚	唇色淡白、头晕眼花、手足发麻、妇女经行量少、舌质淡
血瘀	痛如针刺（刺痛）、拒按、痛处固定不移、面色晦暗、舌有瘀斑、口干但欲漱水不欲咽
血热	心烦、躁扰发狂、口干不喜饮、身热、舌红绛
血寒	得暖痛减、形寒肢冷、妇女少腹冷痛、畏寒肢冷，局部冷痛

**最佳选择题**

口干，但欲漱水不欲咽，可见于

- A. 阴虚证
- B. 湿热证
- C. 痰饮内停
- D. 瘀血阻滞
- E. 里寒证

**【答案】** D

**考点 28. 气血同病主要证候的临床表现**

气血同病	主要典型症状
------	--------

气滞血瘀	气滞+血瘀	胸胁胀满走窜疼痛；痞块刺痛拒按，舌紫暗有瘀斑
气血两虚	气虚+血虚	少气懒言、乏力自汗；面色苍白，舌淡而嫩
气不摄血	气虚+少量出血	出血的同时，伴有气短、倦怠乏力、面色苍白，兼见脾虚的症状
气随血脱	大量出血+气脱	大量出血；面色（白光）白、四肢厥冷、大汗淋漓，甚至晕厥

### 最佳选择题

患者胸胁胀满，走窜疼痛，性情急躁，并兼见痞块刺痛拒按，舌紫暗或有瘀斑。辨析其证候是

- A. 气虚血瘀
- B. 气滞血瘀
- C. 气随血脱
- D. 气血两虚
- E. 气不摄血

【答案】B

### 考点 29. 重点常用医学检查指标及其典型的临床意义

医学指标	英文缩写	典型临床意义
红细胞计数	RBC	诊断贫血的主要指标之一
血红蛋白	Hb	Hb 量减少是诊断贫血的重要指标，但不能确定贫血的类型
淀粉酶	AMY	主要用于急性胰腺炎的诊断和鉴别诊断
血清肌酸激酶	血清 CK	血清 CK 为早期诊断急性心肌梗死（AMI）的灵敏指标之一
尿酸	UA	尿酸增高是诊断痛风的主要实验室依据
糖化血红蛋白	HbA <sub>1c</sub>	可作为糖尿病长期控制状况的良好观察指标
乙肝病毒 DNA	HBV-DNA	诊断乙型肝炎的直接依据

### 最佳选择题

诊断乙型肝炎的直接证据是

- A. HBsAg
- B. 抗-HBc
- C. HBeAg

D. HBV-DNA

E. 抗-HBs

【答案】D

【解析】乙型肝炎病毒 DNA (HBV-DNA) 是诊断乙型肝炎的直接证据，比血清免疫学检查更灵敏，特异性更强。

考点 30. 汗法的

汗法（解表法）	适用病证		临床表现
辛温解表法	外感风寒表证		恶寒重，发热轻，无汗，头痛身疼，鼻塞，流清涕，咳嗽，痰白清稀。舌苔薄白，脉浮紧
辛凉解表法	外感风热表证		发热重，恶寒轻，咽干，口渴，鼻塞，流黄涕，咳嗽，痰黏或黄。舌苔薄黄，脉浮数
透疹解表法	表邪外束，疹毒内陷，麻疹不透之证		发热恶风，麻疹透发不出，或出而不畅。舌苔薄黄，脉浮数
扶正解表法（体虚外感表证）	益气解表法	气虚	恶寒发热，无汗，头痛鼻塞，倦怠无力，气短懒言，舌淡苔白，脉浮无力
	养血解表法	血虚	头痛身热，微寒无汗，面色不华，唇甲色淡，心悸头晕，舌淡苔白，脉细
	滋阴解表法	阴虚	恶寒发热，头痛，干咳少痰，手足心热，心烦，口渴，咽干，舌红，脉细数
	助阳解表法	阳虚	恶寒发热，无汗，头身痛等表证外，兼见形寒肢冷，面白声微，舌淡苔白，脉浮无力

最佳选择题

属于扶正解表法的是

A. 辛凉解表法

B. 透疹解表法

C. 养血解表法

D. 和解少阳法

E. 调和肠胃法

【答案】C

【解析】扶正解表法包括益气解表法、养血解表法、滋阴解表法、助阳解表法。

考点 31. 吐法

吐法(涌吐法)	适用病证	临床表现
峻吐法	体壮邪实, 痰食停蓄在咽喉、胸膈、胃脘的病证	痰涎壅滞胸中, 症见痰涎壅盛, 胸中痞硬, 心中烦闷, 气上冲咽喉不得息, 寸脉浮且按之紧
		宿食内停上脘, 症见胸闷脘胀, 时时欲吐而不得吐
		中风实证之闭证, 症见不省人事, 不能言语, 痰涎壅盛
		癫痫发作, 症见痰浊壅塞; 误食毒物, 尚在胃脘等, 均宜及时峻吐
缓吐法	虚证催吐	邪盛正虚, 痰涎、宿食、毒物之邪在上焦, 非吐难以祛除, 宜邪正兼顾之缓吐法

最佳选择题

痰涎壅盛, 胸中痞硬, 心中烦闷, 气上冲咽喉不得息。应采用的方法是

- A. 寒下法
- B. 峻吐法
- C. 缓吐法
- D. 温下法
- E. 润下法

【答案】B

考点 32. 下法

下法(泻下法)	适用病证	临床表现
寒下法	热结便秘证	高热谵语, 大便秘结, 腹胀腹痛, 口舌干燥。舌红, 苔黄或黄燥, 脉滑数
温下法	寒积便秘证	大便秘结, 脘腹冷痛, 喜温拒按, 畏寒肢冷, 甚或手足厥逆。舌淡, 苔白滑或白腻, 脉沉紧或沉弦
润下法	血虚津枯、肠燥便秘证	大便秘结, 脘腹痞满, 不思饮食, 口唇干燥, 面色无华。舌红, 少苔, 脉细涩
泻下逐水法	水饮邪热壅实、形气俱实	胸腹水肿, 口渴, 气粗, 腹坚, 二便不通。舌苔白腻, 脉沉实有力

	之胸腹水	
攻补兼施法	里实积滞、邪实正虚之便秘证	里热实结、气血虚弱者，症见大便秘结，下之不通，身热口渴，气短乏力等
		里实热结、津液损伤者，症见大便秘结，下之不通，口唇干燥；寒实内结、气虚阳衰者，症见大便秘结，腹痛得温则快，或久利赤白，手足不温等

**最佳选择题**

某女，28岁。产后5天，大便秘结，脘腹痞满，不思饮食，口唇干燥，面色无华。舌红，少苔，脉细涩。治疗宜采用的治法是

- A. 寒下法
- B. 温下法
- C. 润下法
- D. 泻下逐水法
- E. 攻补兼施法

【答案】C

**考点 33. 和法**

和法(和解法)	适用病证	临床表现
和解少阳法	邪犯少阳之证	寒热往来，胸胁苦满，不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩。舌苔薄白，脉弦
调和肝脾法	肝气郁结，横犯脾胃，或脾虚不运，肝失疏泄，肝脾不和之证	胸闷胁痛，脘腹胀痛，不思饮食，大便溏泻，或妇女乳房胀痛，月经不调及痛经
调和肠胃法	肠胃不和证	心下痞硬，满闷不舒，欲呕不食，或肠鸣下利

**多项选择题**

以下属于“和法”范畴的有

- A. 和解少阳法
- B. 调和肝脾法
- C. 消痞散结法
- D. 软坚散结法

E. 调和肠胃法

【答案】ABE

考点 34. 温法

温法(温里法)	适用病证	临床表现
温中祛寒证	中焦虚寒证	脘腹冷痛, 肢体倦怠, 手足不温, 恶心呕吐, 腹痛泄泻, 口淡不渴。舌苔白滑, 脉沉迟
回阳救逆法	阳气衰微、阴寒内盛之证	四肢厥逆, 恶寒踡卧, 吐利腹痛, 下利清谷。脉沉细或沉微
温经散寒法	寒滞经脉证	腰、腿、足等部位疼痛, 手足不温。舌淡, 苔白, 脉沉细

临床常用的温肺化饮、温化寒痰、温肾利水、温经暖肝、温胃理气等, 皆属温法范畴。

最佳选择题

某女, 77 岁。四肢厥逆, 恶寒踡卧, 吐利腹痛, 下利清谷。中医辨证为亡阳证, 治疗宜选用的治法是

- A. 温经散寒法
- B. 回阳救逆法
- C. 温中祛寒法
- D. 温经暖肝法
- E. 温肺化饮法

【答案】B

考点 35. 清法

清法(清热法)	适用病证	临床表现
清热泻火法	气分实热证	壮热面赤, 烦躁, 口渴, 汗出。舌红, 苔黄, 脉洪大有力
清热凉血法	热入营血证	身热夜甚, 心烦失眠, 神昏谵语。舌质绛, 脉细数
清热燥湿法	湿热内蕴证	湿热蕴积胃肠所致泄泻、痢疾
		湿热蕴结肝胆所致黄疸
		湿热下注膀胱而致淋证
		湿热蕴结下焦而致带下
清热解毒法	热毒壅盛证	三焦火毒热盛, 可见身热烦躁, 口燥咽干, 错语不眠, 脉数

		有力
		热毒壅聚上焦中焦, 可见身热口渴, 面赤唇焦, 胸膈烦热, 口舌生疮, 舌红, 苔黄, 脉滑数
		热毒壅于上焦, 可见头面红肿, 腮颐肿大, 咽喉肿痛
		热毒壅结于肌肤, 可见疮痍肿毒, 局部红肿热痛
		热毒蕴于大肠, 可见热毒泻痢, 腹痛腹泻, 里急后重, 下利赤白, 肛门灼热, 舌红, 苔黄, 脉滑数
清虚热法	阴虚发热证	午后或夜间发热, 手足心热, 或骨蒸潮热, 心烦少寐, 颧红, 盗汗, 口干咽燥。舌红, 少苔, 脉细数

### 1. 最佳选择题

某男, 35岁。壮热面赤, 烦躁, 口渴, 汗出。舌红, 苔黄, 脉洪大有力。治疗宜采用的治法是

- A. 清热解毒法
- B. 清热泻火法
- C. 清热凉血法
- D. 清热燥湿法
- E. 清虚热法

【答案】B

考点 36. 消法

消法(消导法)	适用病证	临床表现
消食导滞法	食积停滞证	脘腹痞满, 恶心呕吐, 噎腐吞酸, 厌食纳呆, 大便泄泻。舌苔厚腻, 脉滑
消痞散结法	气滞血瘀痰凝等所致的癥积痞块证	两胁癖积, 脘腹癥结, 攻撑作痛, 饮食少进, 肌肉消瘦等
软坚散结法	痰浊瘀血等结聚有形的瘰疬、癭瘤、癥瘕、久疔等	下颌、颈部、乳房、两胁、脘腹等部位按之较硬, 推之不移的有形肿块

### 最佳选择题

适用于气滞血瘀痰凝等所致的癥积痞块证的治法是

- A. 峻吐法

- B. 消痞散结法
- C. 消食导滞法
- D. 软坚散结法
- E. 清热燥湿法

【答案】D

考点 37. 补法

补法(补益法)	适用病证	临床表现
补气法	气虚	<p>总体症状是“面少畏神语+无力”(面色㿔白、少气懒言、畏风自汗、神疲倦怠、语音低微、无力)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 脾气虚证-症见食欲不振, 脘腹虚胀, 大便溏薄, 体倦神疲, 面色萎黄, 消瘦等</li> <li>2. 肺气虚证-症见气少喘促, 动则益甚, 咳嗽无力, 声音低怯, 甚或喘促等</li> <li>3. 心气虚证-症见心悸怔忡, 胸闷气短, 活动后加重</li> <li>4. 肾气虚证, 症见腰膝酸软, 头晕耳鸣, 神疲乏力</li> </ol>
补血法	血虚	<p>面色苍白或萎黄, 唇爪苍白, 眩晕耳鸣, 心悸怔忡, 失眠健忘, 或月经量少色淡, 甚则闭经。舌淡, 脉细</p>
补阴法	阴虚	<p>总体症状是“两颧红赤, 潮热盗汗, 五心烦热, 舌红少苔, 脉细数”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 心阴虚证, 症见心悸心烦, 五心烦热, 潮热盗汗等</li> <li>2. 肺阴虚证, 症见干咳无痰, 或痰少而黏, 口燥咽干, 形体消瘦, 潮热盗汗, 声音嘶哑等</li> <li>3. 肝阴虚证, 症见头晕耳鸣, 两目干涩, 胁肋灼痛, 五心烦热, 潮热盗汗等</li> <li>4. 肾阴虚证, 症见腰膝酸痛, 眩晕耳鸣, 失眠多梦, 遗精, 五心烦热, 潮热盗汗等</li> <li>5. 脾胃阴虚证, 症见胃脘隐痛, 饥不欲食, 口燥咽干, 大便干结等。</li> </ol>
补阳法	阳虚	气虚+寒象

	畏寒肢冷，腰膝酸软，性欲淡漠，阳痿早泄，宫寒不孕，五更泄泻
--	-------------------------------

### 最佳选择题

某男，35岁。畏寒肢冷，腰膝酸软，性欲淡漠，五更泄泻。治疗应选用的治法是

- A. 补气法
- B. 补阴法
- C. 补阳法
- D. 补血法
- E. 气血双补法

【答案】C

### 考点 38. 内科疾病-感冒

1. 疾病介绍：感冒是感受风邪或时行病毒，卫表失和而导致的常见外感疾病，临床表现以鼻塞、流涕、喷嚏、头痛、恶寒、发热、全身不适、脉浮为特征。

#### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
风寒感冒	恶寒重，发热轻，无汗头痛，肢体酸痛，舌苔薄白，脉浮紧	辛温解表，宣肺散寒	荆防败毒散	荆防败毒散 感冒清热颗粒 感冒软胶囊 九味羌活丸 葛根汤颗粒
风热感冒	身热较著，微恶风，头胀痛，咽痛咽红，口渴。舌边尖红，脉浮数	辛凉解表，宣肺清热	银翘散	银翘解毒丸 双黄连口服液 桑菊感冒片 感冒清胶囊 柴银口服液
时行感冒	突然发热，高热不退，甚则寒战，周身酸痛，无汗，伴明显全身症状，呈现流行性发作。舌红，	清热解毒，凉血泻火	清瘟败毒饮	清瘟解毒片 连花清瘟胶囊 维C银翘片 银翘伤风胶囊

	苔黄，脉浮数			
气虚感冒	发热，恶寒较甚，无汗，头痛鼻塞，身楚倦怠，咳嗽，痰白，咳痰无力。舌淡，苔白，脉浮而无力	益气解表	参苏饮	参苏丸 败毒散

### 最佳选择题

某男，25岁，感受外邪后出现发热，微恶风，头胀痛，咳嗽痰少，咽痛口干。舌红苔薄黄，脉浮数。应选用的中医治疗法是

- A. 辛温解表，宣肺清热
- B. 辛凉解表，宣肺清热
- C. 益气解表，宣肺清热
- D. 化痰解表，宣肺清热
- E. 养阴解表，宣肺清热

【答案】B

【解析】根据患者症状“发热，微恶风，头胀痛，口干”可以判断感受了热邪，又根据“脉浮数”可辨证为风热表证，诊断为风热感冒。感冒-风热感冒【治法】辛凉解表，宣肺清热。

### 考点 39. 内科疾病-咳嗽

1. 疾病介绍：咳嗽是指肺失宣降，肺气上逆作声，或伴咳吐痰液，为肺系疾病的主要表现之一。

#### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
风寒袭肺证	咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，舌苔薄白，脉浮或浮紧	疏风散寒，宣肺止咳	三拗汤合止嗽散	通宣理肺丸 风寒咳嗽丸 杏苏止咳糖浆 三拗片
风热犯肺证	咳嗽频剧，气粗，咳痰不爽，痰黏稠，喉燥咽	疏风清热，宣肺止咳	桑菊饮	桑菊感冒片 急支糖浆

	痛, 口渴, 鼻流黄涕, 头痛, 肢楚, 恶风身热。舌边尖红, 苔薄黄, 脉浮数			羚羊清肺颗粒 风热咳嗽胶囊
风燥伤肺证	干咳, 连声作呛, 咽痒, 咽喉干痛, 唇鼻干燥, 口干, 舌质红而少津, 苔薄白或薄黄, 脉浮数	疏风清肺, 润燥止咳	桑杏汤	蜜炼川贝枇杷膏 二母宁嗽丸 雪梨止咳糖浆
痰湿蕴肺证	咳嗽反复发作, 咳声重浊, 痰黏腻, 痰多易咳, 早晨或食后咳甚痰多, 进甘甜油腻物加重, 胸闷脘痞, 呕恶, 食少, 体倦, 大便时溏。舌苔白腻, 脉滑	健脾燥湿, 化痰止咳	二陈平胃散合三子养亲汤	二陈丸 橘贝半夏颗粒 蛇胆陈皮胶囊
痰热郁肺证	咳嗽, 气息粗促, 或喉中有痰声, 痰多, 质黏稠色黄, 或有腥味, 难咳, 胸胁胀满, 或咳时引痛, 面赤, 或有身热, 口干而黏, 欲饮水。舌红, 苔黄腻, 脉滑数	清热肃肺, 豁痰止咳	清金化痰汤	清肺化痰丸 清肺抑火丸 复方鲜竹沥液
肺阴亏耗证	咳嗽日久, 干咳少痰, 或痰中带血, 午后咳甚, 或伴五心烦热, 颧红, 耳鸣, 消瘦, 神疲。舌质红, 苔少, 脉细数	滋阴润肺, 止咳化痰	沙参麦冬汤	养阴清肺膏 百合固金丸 二冬膏

### 最佳选择题

根据常见病辨证论治的理论, 咳嗽风寒袭肺证的主要症状是

- A. 咳嗽气粗，咳痰黄稠
- B. 干咳无痰，鼻燥咽干
- C. 咳嗽痰多，食后加重
- D. 咳嗽声重，痰稀色白
- E. 咳嗽气急，遇怒诱发

【答案】D

考点 40. 内科疾病-肺胀

1. 疾病介绍：肺胀是多种肺系疾患反复发作，迁延不愈，导致肺气胀满，不得敛降的疾病，临床表现为胸部膨满，憋闷如塞，喘息上气，咳嗽痰多，烦躁，心悸，面色晦暗，或唇甲青紫，脘腹胀满，肢体浮肿等。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
痰浊阻肺证	胸膈满闷，短气喘息，稍劳即著，咳嗽痰多，色白黏腻或呈泡沫，畏风易汗，脘痞纳少，倦怠乏力。舌暗，苔薄腻或浊腻，脉小滑	化痰降气，健脾益肺	苏子降气汤合三子养亲汤	苏子降气丸 理气定喘丸
痰热郁肺证	咳逆，喘息气粗，胸满，目胀睛突，痰黄或白，黏稠难咳，烦躁，口渴欲饮，尿赤，大便干。舌边尖红，苔黄或黄腻，脉数或滑数	清肺化痰，降逆平喘	越婢加半夏汤或桑白皮汤	止咳平喘糖浆 清肺消炎丸
肺肾气虚证	胸部膨满，呼吸浅短难续，声低气怯，甚则张口抬肩，不能平卧，咳嗽，痰白如沫，咳吐不利，胸闷心慌，形寒汗	补肺摄纳，降气平喘	平喘固本汤合补肺汤	参茸黑锡丸 百令胶囊

出，腰膝酸软，小便清长，或尿有余沥。舌淡或暗紫，脉沉细无力，或结、代			
------------------------------------	--	--	--

1. 最佳选择题

肺胀肺肾气虚证可选用的方剂是

- A. 苏子降气汤合三子养亲汤
- B. 越婢加半夏汤合桑白皮汤
- C. 平喘固本汤合补肺汤
- D. 金匱肾气丸合生脉散
- E. 桑白皮汤合杏苏散

【答案】C

考点 41. 内科疾病-心悸

1. 疾病介绍：心悸是患者自觉心中悸动，惊惕不安，甚则不能自主的疾病，临床一般多呈反复发作性，每因情志波动或劳累而发作，且常伴胸闷、气短、失眠、健忘、眩晕、耳鸣等症状。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
心脾两虚证	心悸气短，头晕目眩，失眠健忘，面色无华，倦怠乏力，纳呆食少。舌淡红，脉细弱	补血养心，益气安神	归脾汤	人参归脾丸 复方扶芳藤合剂 益气养血口服液 消疲灵颗粒
阴虚火旺证	心悸易惊，心烦失眠，五心烦热，口干，盗汗，思虑劳心则症状加重，伴耳鸣腰酸，头晕目眩，急躁易怒。舌红少津，苔少或无，脉细数	滋阴清火，养心安神	天王补心丹	天王补心丸 朱砂安神片 宁神补心片 安神补心丸
心阳不	心悸不安，胸闷气短，	温补心阳，安神	桂枝甘草龙	参仙升脉口服液

振证	动则尤甚，面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白。脉虚弱或沉细无力	定悸	骨牡蛎汤合参附汤	心宝丸 芪苈强心胶囊
瘀阻心脉证	心悸不安，胸闷不舒，心痛时作，痛如针刺，唇甲青紫。舌质紫暗或有瘀斑，脉涩或结或代	活血化瘀，理气通络	桃仁红花煎合桂枝甘草龙骨牡蛎汤	血府逐瘀口服液 七叶神安片 稳心颗粒 参松养心胶囊

### 最佳选择题

某女。55岁。心悸气短，头晕目眩，面色无华，倦怠乏力，纳呆食少，舌淡红，脉细弱，中医应辨证为

- A. 心脾两虚证
- B. 阴虚火旺证
- C. 心阳不振证
- D. 瘀阻心脉证
- E. 肺肾两虚证

【答案】A

### 考点 42. 内科疾病-胸痹

1. 疾病介绍：胸痹是指以胸部闷痛，甚则胸痛彻背，短气、喘息不得卧为主症的疾病。西医学的冠心病(心绞痛或心肌梗死)、其他原因引起的心绞痛(如主动脉瓣狭窄、梗阻性肥厚型心肌病)、心包炎以及肺源性心脏病等以上述表现为主者，可参考此内容辨证论治。

#### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
气虚血瘀证	胸痛隐隐，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗。舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉弱而涩，或结、代	益气活血，通脉止痛	补阳还五汤	芪参益气滴丸 参桂胶囊 心力丸 活心丸
气滞血瘀证	心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处，入夜为甚，	理气活血，通脉止痛	血府逐瘀汤	血府逐瘀口服液

	舌质紫暗，有瘀斑，苔薄，脉弦细			速效救心丸 复方丹参滴丸 冠心丹参滴丸 银丹心脑通软胶囊
痰浊痹阻证	胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，遇阴雨天而易发作或加重，舌体胖大且边有齿痕，苔浊腻或白滑，脉滑	通阳泄浊，豁痰宣痹	瓜蒌薤白半夏汤 合涤痰汤	血滞通胶囊 丹蒺片 舒心降脂片 降脂通络软胶囊
寒凝心脉证	猝然心痛如绞，心痛彻背，喘不得卧，多因气候骤冷或骤感风寒而发病或加重，伴形寒，甚则手足不温，冷汗自出，胸闷气短，心悸，面色苍白。舌质紫暗，或有瘀斑瘀点，苔薄，脉沉紧或沉细	辛温散寒，宣通心阳	枳实薤白桂枝汤 合当归四逆汤	宽胸气雾剂 苏合香丸 冠心苏合滴丸 神香苏合丸（庆余救心丸）
气阴两虚证	胸闷隐痛，时作时止，心悸气短，动则益甚，伴倦怠懒言，易汗出，头晕，失眠多梦。舌红或淡红，舌体胖且边有齿痕，苔薄白或少，脉细缓或结代	益气养阴，活血通脉	生脉散合人参养荣汤	益心胶囊 益心舒胶囊 益心通脉颗粒 冠心生脉口服液

### 最佳选择题

可参考胸痹辨证论治的西医疾病是

- A. 高血压病
- B. 支气管炎
- C. 冠心病
- D. 支气管扩张症
- E. 病毒性肺炎

【答案】C

考点 43. 内科疾病-不寐

1. 疾病介绍: 不寐是以经常不能获得正常睡眠为特征的疾病。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
肝火扰心证	不寐多梦, 甚则彻夜不眠, 急躁易怒, 舌红苔黄, 脉弦而数	疏肝泻火, 镇心安神	龙胆泻肝汤	泻肝安神丸 复方罗布麻颗粒
痰热扰心证	心烦不寐, 胸闷脘痞, 泛恶暖气, 伴口苦, 头重, 目眩。舌质偏红, 苔黄腻, 脉滑数	清化热痰, 和中安神	黄连温胆汤	心速宁胶囊 礞石滚痰丸 补脑丸
心脾两虚证	不易入睡, 多梦易醒, 心悸健忘, 神疲食少, 伴头晕目眩, 四肢倦怠, 腹胀便溏, 面色少华。舌淡苔薄, 脉细无力	补益心脾, 养血安神	归脾汤	北芪五加片 眠安宁口服液 脑力静糖浆
心肾不交证	心烦不寐, 入睡困难, 心悸多梦, 伴头晕耳鸣, 腰膝酸软, 潮热盗汗, 五心烦热, 咽干少津, 男子遗精, 女子月经不调。舌红少苔, 脉细数	滋阴降火, 交通心肾	六味地黄丸合交泰丸	乌灵胶囊 滋肾宁神丸
心胆气	虚烦不眠, 触事易惊,	益气镇惊, 安神	安神定志丸合酸	柏子养心丸

虚证	终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力。舌淡，脉弦细	定志	枣仁汤	
----	-----------------------------	----	-----	--

### 最佳选择题

某女，25岁，虚烦不眠，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力。舌淡，脉弦细。应选用的中成药是

- A. 人参归脾丸
- B. 天王补心丸
- C. 柏子养心丸
- D. 养血安神丸
- E. 解郁安神颗粒

【答案】C

### 考点 44. 内科疾病-胃痛

1. 疾病介绍：胃痛又称胃脘痛，是以上腹胃脘部近心窝处疼痛为主要表现的疾病。
2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
寒邪客胃证	胃痛暴作，喜温恶寒，得温痛减，口和不渴，或喜热饮。舌淡，苔薄白，脉弦紧	温胃散寒，行气止痛	良附丸	良附丸 安中片（素片） 仲景胃灵片
饮食伤胃证	胃脘疼痛，胀满拒按，嗳腐吞食，或吐不消化食物，吐后或矢气后痛减，大便不爽。舌淡红，苔厚腻，脉滑	消食导滞，和胃止痛	保和丸	槟榔四消丸 开胸顺气丸 沉香化滞丸 加味保和丸
肝气犯胃证	胃脘胀痛，痛连两胁，遇烦恼则痛作或痛甚，嗳气、矢气则舒，脘闷暖气，善太息，大便不畅。舌淡红，苔薄白，脉弦	疏肝解郁，理气止痛	柴胡疏肝散	沉香化气丸 朴沉化郁丸 舒肝健胃丸 舒肝和胃丸 调胃舒肝丸
湿热中	胃脘疼痛，痛势急迫，脘闷灼	清化湿热，	清中汤	木香槟榔丸

阻证	热，口干口苦，口渴不欲饮，纳呆恶心，小便色黄，大便不畅。舌红，苔黄腻，脉滑数	理气和胃		中满分消丸 胃痛宁片
胃阴亏耗证	胃脘隐隐灼痛，似饥而不欲食，口干咽燥，口渴思饮，五心烦热，消瘦乏力，大便干结。舌红少津，脉细数	养阴益胃，和中止痛	一贯煎合芍药甘草汤	胃尔康片 胃乐新颗粒 胃安胶囊 阴虚胃痛颗粒
脾胃虚寒证	胃痛隐隐，绵绵不休，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛缓，劳累或受凉后发作或加重，时呕清水，神疲纳少，四肢倦怠，手足不温，大便溏薄	温中健脾，和胃止痛	黄芪建中汤	黄芪健胃膏 温胃舒胶囊 胃溃灵颗粒 虚寒胃痛胶囊

### 最佳选择题

某男，40岁。平素性情急躁易怒，胃痛半月余，辨证为肝气犯胃，其临床特点是

- A. 胃痛暴作，喜温恶寒
- B. 胃痛胀满，噎腐恐食
- C. 胃痛隐隐，饥不欲食
- D. 胃脘胀痛，连及肋肋
- E. 胃脘灼痛，病势急迫

【答案】D

【解析】胃痛-肝气犯胃证【症状】胃脘胀痛，痛连两肋，遇烦恼则痛作或痛甚，嗳气、矢气则舒，脘闷暖气，善太息，大便不畅。舌淡红，苔薄白，脉弦。

### 考点 45. 内科疾病-便秘

1. 疾病介绍：便秘是指粪便在肠内滞留过久，秘结不通，排便周期延长，或周期不长，但粪质干结，排出艰难，或粪质不硬，虽有便意，但排而不畅的疾病。

#### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
热秘	大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，	泻热导滞，润肠通便	麻子仁丸	麻仁胶囊 麻仁润肠丸

	或有身热，小便短赤。 舌红，苔黄燥，脉滑数			麻仁滋脾丸 通幽润燥丸 清泻丸 复方芦荟胶囊
气秘	大便干结，或不甚干结， 欲便不得出，或便出不 爽，胸胁痞满，肠鸣矢 气，腹中胀痛，嗝气频 作，纳食减少。舌苔薄 腻，脉弦	顺气导滞	六磨汤	四磨汤口服液 厚朴排气合剂
冷秘	大便艰涩，腹痛拘急， 胀满拒按，胁下偏痛， 手足不温，呃逆呕吐。 舌苔白腻，脉弦紧	温里散寒，通便 止痛	温脾汤合半硫丸	小建中合剂与 四磨汤口服液 联合使用
虚秘	大便并不干硬，虽有便 意，但排便困难，用力 努挣则汗出短气，便后 乏力，面白神疲，肢倦 懒言。舌淡苔白，脉弱	益气润肠	黄芪汤	便秘通 便通胶囊 芪蓉润肠口服 液 苁蓉通便口服 液

### 最佳选择题

热秘的特征为

- A. 大便干结，小便短赤
- B. 大便秘结，欲便不得
- C. 虽有便意，努挣乏力
- D. 大便艰涩，排出困难
- E. 大便不干，小便清长

【答案】A

考点 46. 内科疾病-头痛

1. 疾病介绍: 以头痛为主要表现的疾病。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
风寒头痛	头痛时作, 痛连项背, 常有拘急收紧感, 伴恶风畏寒, 受风尤剧, 口不渴。舌苔薄白, 脉浮紧	疏风散寒止痛	川芎茶调散	川芎茶调颗粒 天麻头痛片 都梁软胶囊
风热头痛	头痛而胀, 甚则头痛如裂, 发热或恶风, 口渴欲饮, 面红目赤, 或便秘溲黄。舌尖红, 苔黄, 脉浮数	疏风清热和络	芎芷石膏汤	清眩片 芎菊上清丸
肝阳头痛	头昏胀痛, 两侧为重, 心烦易怒, 夜寐不宁, 口苦面红, 或兼胁痛。舌红苔黄, 脉弦数	平肝潜阳息风	天麻钩藤饮	天麻钩藤颗粒 天麻首乌片 清脑降压片 脑立清丸
血虚头痛	头痛隐隐, 时时昏晕, 心悸失眠, 面色少华, 神疲乏力, 遇劳加重。舌质淡, 苔薄白, 脉细弱	养血滋阴, 和络止痛	加味四物汤	益血生胶囊
瘀血头痛	头痛经久不愈, 痛处固定不移, 痛如锥刺, 或有头部外伤史。舌紫暗, 或有瘀斑, 瘀点, 苔薄白, 脉细或细涩	活血化瘀, 通窍止痛	通窍活血汤	血府逐瘀口服液 通天口服液 逐瘀通脉胶囊 丹七片

最佳选择题

头痛而胀, 严重时头痛如裂, 口渴欲饮, 面红目赤, 舌尖红, 苔黄, 脉浮数, 中医应辨

证为

- A. 风寒头痛
- B. 风热头痛
- C. 瘀血头痛
- D. 肝阳头痛
- E. 血虚头痛

【答案】B

【解析】风热头痛【症状】头痛而胀，甚则头痛如裂，发热或恶风，口渴欲饮，面红目赤，或便秘溲黄。舌尖红，苔黄，脉浮数。

#### 考点 47. 内科疾病-胁痛

1. 疾病介绍：胁痛是指以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要表现的疾病。
2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
肝郁气滞	胁肋胀痛，走窜不定，甚则引及项背肩臂，疼痛每因情志变化而增减，胸闷腹胀，暖气频作，得暖气而胀痛稍舒，纳少口苦。舌苔薄白，脉弦	疏肝理气	柴胡疏肝散	柴胡舒肝丸 四逆散 舒肝止痛片
肝胆湿热证	胁肋重着疼痛或灼热疼痛，口苦口黏，胸闷纳呆，恶心呕吐，小便黄赤，大便不爽，或兼有身热恶寒，身目发黄。舌红苔黄腻，脉弦滑数	清热利湿	龙胆泻肝汤	龙胆泻肝丸 利胆片 胆石清片
瘀血阻络证	胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，肋肋下或见有积块。舌质紫暗，脉沉涩	祛瘀通络	血府逐瘀汤	血府逐瘀口服液 元胡止痛片 和络舒肝胶囊 肝达康颗粒
肝络失	胁肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，	养阴柔肝	一贯煎	复方益肝灵片

养证	口干咽燥，心中烦热，头晕目眩。 舌红少苔，脉细弦而数		慢肝养阴胶囊
----	-------------------------------	--	--------

### 最佳选择题

一贯煎可用于治疗胁痛，适用的证候是

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝胆湿热证
- C. 瘀血阻络证
- D. 心脾两虚证
- E. 肝络失养证

【答案】E

### 考点 48. 内科疾病-汗证

1. 疾病介绍：汗证是以汗液外泄失常为主症的疾病。不因外界环境因素的影响，白昼时汗出，动辄益甚者称为自汗；寐中汗出，醒来即止者称为盗汗。

#### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
肺卫不固证	汗出恶风，稍劳尤甚，易于感冒，体倦乏力，面色少华。舌苔薄白，脉细弱	益气固表	玉屏风散	玉屏风颗粒 复芪止汗颗粒 虚汗停颗粒
心血不足证	睡则汗出，醒则自止，心悸怔忡，失眠多梦，神疲气短，面色少华。舌质淡，舌苔白，脉细	补养心血	归脾汤	归脾丸 健脾生血颗粒 参茸卫生丸
阴虚火旺证	夜寐盗汗，或有自汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴。舌红少苔，脉细数	滋阴降火	当归六黄汤	知柏地黄丸 心脑舒口服液
邪热郁蒸证	蒸蒸汗出，汗黏，易使衣服黄染，面赤烘热，	清肝泄热，化湿和营	龙胆泻肝汤	龙胆泻肝丸

烦躁，口苦，小便色黄。 舌苔薄黄，脉弦			
------------------------	--	--	--

### 最佳选择题

患者夜寐盗汗，五心烦热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。治疗应首选

- A. 黄连阿胶汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 当归六黄汤
- D. 养阴清肺汤
- E. 甘麦大枣汤

【答案】C

### 考点 49. 内科疾病-消渴

1. 疾病介绍：消渴是以多饮、多食、多尿、乏力、消瘦，或尿有甜味为主要临床表现的疾病（三多一少）。西医学的糖尿病、尿崩症和精神性多饮、多尿症等可参考此内容来辨证论治。

#### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
阴虚燥热证	烦渴引饮，消谷善饥，小便频数而多，尿浑而黄，形体消瘦。舌红，苔薄黄，脉滑数	养阴润燥	玉女煎	降糖胶囊 消渴平片 消糖灵胶囊
脾胃气虚证	口渴引饮，能食与便溏并见，或饮食减少，精神不振，四肢乏力	舌淡，苔薄白而干，脉细弱无力	健脾益气	参苓白术散 益津降糖口服液
气阴两虚证		体瘦，舌质淡红，苔白而干，脉弱	益气健脾，生津止渴	七味白术散 参精止渴丸 参芪降糖胶囊 消渴丸
肾阴亏虚	尿频量多，浊如膏脂，腰酸膝	滋养肾	六味地黄丸	六味地黄丸

证	软, 头晕耳鸣, 多梦遗精, 乏力, 皮肤干燥。舌红少苔, 脉细数	阴		麦味地黄丸
阴阳两虚证	小便频数, 甚则饮一溲一, 咽干舌燥, 面容憔悴, 耳轮干枯, 腰膝酸软, 畏寒肢冷。舌淡, 苔白少津, 脉沉细无力	温 阳 滋 肾	肾气丸	金匱肾气丸

### 最佳选择题

某男, 77 岁。患消渴病 20 余年, 小便频数, 饮一溲一, 咽干舌燥, 腰膝酸软, 畏寒肢冷。诊察患者, 见面容憔悴, 耳轮干枯; 舌淡, 苔白少津, 脉沉细无力。中医辨证是

- A. 阴阳两虚
- B. 肾阴亏虚
- C. 脾胃气虚
- D. 阴虑燥热
- E. 肾阳虚衰

【答案】A

### 考点 50. 内科疾病-淋证

1. 疾病介绍: 淋证是指以小便频数短涩, 淋漓刺痛, 小腹拘急引痛为主症的疾病。西医学的泌尿系感染、尿路结石、前列腺炎、尿道综合征等病, 可参考淋证来辨证论治。

#### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
热淋	小便频数短涩, 灼热刺痛, 尿色黄赤, 少腹拘急胀痛, 或有寒热, 口苦, 呕恶, 或腰痛拒按, 或大便秘结。舌质红, 苔黄腻, 脉滑数	清热利湿通淋	八正散	八正胶囊 复肾宁片 分清五淋丸
石淋	尿中夹有砂石, 排尿涩痛, 或排尿时突然中断, 尿道窘迫疼痛, 少腹拘急, 往往突发一侧腰腹绞	清热利湿, 排石通淋	石韦散	复方金钱草颗粒 净石灵胶囊 五淋化石丸

	痛难忍，甚则牵及外阴，尿中带血。舌质红，苔薄黄，脉弦或弦数			
血淋	小便热涩刺痛，尿色深红，或夹有血块，疼痛满急加剧，或见心烦。舌尖红，舌苔黄，脉滑数	清热通淋，凉血止血	小蓟饮子	肾炎灵胶囊 五淋丸
气淋	郁怒之后，小便涩滞，淋漓不宣，少腹胀满疼痛。舌苔薄白，脉弦	理气疏导，通淋利尿	沉香散	柴胡舒肝丸
膏淋	小便浑浊，乳白或如米泔水，上有浮油，置之沉淀，或伴有絮状凝块物，或混有血液、血块，尿道热涩疼痛，尿时阻塞不畅，口干。舌质红，苔黄腻，脉濡数	清热利湿，分清泄浊	程氏萆薢分清饮 清饮	萆薢分清丸 前列泰片
劳淋	小便不甚赤涩，溺痛不甚，但淋漓不已，时作时止，遇劳即发，腰膝酸软，神疲乏力，病程缠绵。舌质淡，脉细弱	补脾益肾	无比山药丸	前列回春胶囊 男康片

### 最佳选择题

小便频数短涩，灼热刺痛，尿色黄赤，少腹拘急胀痛，口苦，呕恶，大便秘结。舌质红，苔黄腻，脉滑数。宜选用的方剂是

- A. 八正散
- B. 无比山药丸
- C. 沉香散
- D. 程氏萆薢分清饮
- E. 小蓟饮子

【答案】A

### 考点 51. 内科疾病-癃闭

1. 疾病介绍：癃闭是以小便量少，排尿困难，甚则小便闭塞不通为主症的疾病。西医学的尿潴留及无尿症，如神经性尿闭、膀胱括约肌痉挛、尿道结石、尿路肿瘤、尿道损伤、尿

道狭窄、前列腺增生症、脊髓炎等病所出现的尿潴留以及肾功能不全引起的少尿、无尿症，可参考癃闭来辨证论治。

## 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
膀胱湿热证	小便点滴不通，或量极少而短赤灼热，小腹胀满，口苦口黏，或口渴不欲饮，或大便不畅。舌质红，苔黄腻，脉数	清利湿热， 通利小便	八正散	八正合剂 清淋颗粒
湿热瘀阻证	小便点滴而下，或尿如细线，甚则阻塞不通，烦躁口苦。舌质紫暗或有瘀点。舌苔黄腻，脉涩	行瘀散结， 通利水道	代抵挡汤	癃清片 前列通瘀胶囊 前列通片 癃闭舒胶囊
肾阳衰惫证	小便不通或点滴不爽，排出无力，面色㿠白，神气怯弱，畏寒肢冷，腰膝冷而酸软无力。舌淡胖，苔薄白，脉沉细或弱	温补肾阳， 化气利水	济生肾气丸	济生肾气丸 金匮肾气丸

### 最佳选择题

治疗癃闭湿热瘀阻证，应首选

- A. 桃红四物汤
- B. 失笑散
- C. 丹参饮
- D. 代抵挡汤
- E. 血府逐瘀汤

【答案】D

【解析】癃闭-湿热瘀阻证【方剂应用】基础方剂：代抵挡汤（大黄、当归尾、生地黄、穿山甲、芒硝、桃仁、肉桂、降香）加减。

### 考点 52. 内科疾病-水肿

1. 疾病介绍: 水肿是体内水液潴留, 泛滥肌肤, 表现以头面、眼睑、四肢、腹背, 甚至全身浮肿为特征的疾病。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
风水相搏证	眼睑浮肿, 继则四肢及全身皆肿, 来势迅速, 多有恶寒、发热, 肢节酸楚, 小便不利等	疏风清热, 宣肺行水	越婢加术汤	肾炎解热片
水湿浸渍证	全身水肿, 下肢明显, 按之没指, 小便短少, 身体困重, 胸闷, 纳呆, 泛恶。苔白腻, 脉沉缓。起病缓慢, 病程较长	健脾化湿, 通阳利水	五皮散 合胃苓汤	肾炎消肿片
湿热壅盛证	遍体浮肿, 皮肤绷急光亮, 胸脘痞闷, 烦热口渴, 小便短赤, 或大便干结。舌红, 苔黄腻, 脉沉数或濡数	分利湿热	疏凿饮子	肾炎灵胶囊 肾炎四味片
脾阳虚衰证	身肿日久, 腰以下为甚, 按之凹陷不易恢复, 脘腹胀闷, 纳减便溏, 面色不华, 神疲乏力, 四肢倦怠, 小便短少。舌质淡, 苔白腻或白滑, 脉沉缓或沉弱	温阳健脾, 行气利水	实脾饮	肾炎温阳片
肾阳衰微证	水肿反复消长不已, 面浮身肿, 腰以下甚, 按之凹陷不起, 尿量减少或反多, 腰酸冷痛, 四肢厥冷, 怯寒神疲, 面色㿔白, 甚者心悸胸闷, 喘促难卧, 腹大胀满。舌质淡胖, 苔白, 脉沉细或沉迟无力	温肾助阳, 化气行水	济生肾气丸合真武汤	肾炎舒颗粒 肾炎康复片 肾康宁片

**最佳选择题**

治疗水肿肾阳衰微证, 首选的方剂是

- A. 济生肾气丸合真武汤
- B. 麻黄连翘赤小豆汤

- C. 实脾饮
- D. 五皮饮合胃苓汤
- E. 疏凿饮子

【答案】A

### 考点 53. 内科疾病-腰痛

1. 疾病介绍: 又称“腰脊痛”, 是指因外感、内伤或挫闪等导致腰部气血运行不畅, 或失于濡养, 引起的以腰部一侧或两侧疼痛为主要症状的疾病。

#### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
肾虚腰痛	腰部隐隐作痛, 酸软无力, 劳则加重, 卧则减轻	补肾壮腰。 偏于肾阴虚者, 兼以滋补肾阴; 偏于肾阳虚者, 兼以温补肾阳。	肾阴虚者-左归丸 肾阳虚者-右归丸	左归丸 鱼鳔丸 七宝美髯丸 腰痛片 杜仲补天素片 桂附地黄丸 济生肾气丸 杜仲颗粒
瘀血腰痛	腰痛如刺, 痛有定处, 痛处拒按, 日轻夜重, 轻者俯仰不便, 重则不能转侧。舌质暗紫, 或有瘀斑, 脉涩	活血化瘀, 通络止痛	身痛逐瘀汤	瘀血痹颗粒 舒筋活血定痛散 腰疼丸 腰痹通胶囊
湿热腰痛	腰部疼痛, 重着而热, 暑湿阴雨天气症状加重, 活动后或可减轻, 身体困重, 小便短赤。舌质红, 苔黄腻, 脉濡数或弦数	清热利湿, 舒筋止痛	四妙丸	三妙丸 四妙丸 湿热痹颗粒 豨莶丸 风湿圣药胶囊
寒湿腰痛	腰部冷痛重着, 转侧不	散寒除湿,	甘姜苓术汤	附桂风湿膏

利, 逐渐加重, 静卧疼痛不减, 寒冷和阴雨天加重。舌质淡, 苔白腻, 脉沉而迟缓	温经通络		狗皮膏 风寒双离拐片 祛风舒筋丸
---	------	--	------------------------

### 最佳选择题

某男。48岁。腰部疼痛, 重着而热, 暑湿阴雨天气症状加重, 活动后可减轻, 身体困重, 小便短赤。舌质红, 苔黄腻, 脉滑数, 应选用的方剂为

- A. 身痛逐瘀汤
- B. 四妙丸
- C. 左归丸
- D. 甘姜苓术汤
- E. 右归丸

【答案】B

### 考点 53. 内科疾病-痹证

1. 疾病介绍: 痹证是由于风、寒、湿、热等邪气闭阻经络, 影响气血运行, 导致肢体筋骨、关节、肌肉等处发生疼痛、重着、酸楚、麻木, 或关节屈伸不利、僵硬、肿大、变形等症状的疾病。

#### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
行痹	肢体关节、肌肉疼痛酸楚, 关节屈伸不利, 可涉及肢体多个关节, 疼痛呈游走性, 初起可见恶风、发热等表证。舌苔薄白, 脉浮或浮缓	祛风通络, 散寒除湿	防风汤	九味羌活丸
痛痹	肢体关节疼痛, 痛势较剧, 部位固定, 遇寒则痛甚, 得热则痛缓, 关节屈伸不利, 局部皮肤或有寒冷感。舌质淡, 舌苔薄白, 脉弦紧	散寒通络, 祛风除湿	乌头汤	风湿定片 寒湿痹颗粒

着痹	肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛，肿胀散漫，关节活动不利，肌肤麻木不仁。舌质淡，舌苔白腻，脉濡缓	除湿通络，祛风散寒	薏苡仁汤	风湿痹康胶囊 痹痛宁胶囊 四妙丸 湿热痹颗粒
尪痹	痹证日久不愈，肢体、关节疼痛，屈伸不利，关节肿大僵硬、变形，甚则肌肉萎缩，筋脉拘急，肘膝不伸，或以尻代踵，以背代头，伴腰膝酸软、骨蒸潮热、自汗、盗汗。舌红或淡，脉细数	化痰祛瘀，滋养肝肾	桃红饮合独活寄生汤	独活寄生合剂 尪痹颗粒 天麻丸 益肾蠲痹丸

### 最佳选择题

患者，男，64岁，肢体关节总是疼痛，且痛有定处，遇寒痛增，得温痛减，痛处不红不热而常有冷感，关节屈伸不利，严重影响了正常生活。治宜选用的方剂是

- A. 防风汤
- B. 乌头汤
- C. 薏苡仁汤
- D. 桃红饮合独活寄生汤
- E. 沙参麦冬汤

【答案】B

### 考点 55. 内科疾病-内伤发热

1. 疾病介绍：以发热为主要临床表现的疾病。
2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
气虚发热证	发热，热势或低或高，常在劳累后发作或加剧，倦怠乏力，气短懒言，自汗，易于感冒，食少便溏。舌质淡，苔	益气健脾，甘温除热	补中益气汤	补中益气丸

	薄白，脉细弱			
阴虚发热证	午后潮热，或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥。舌质红，或有裂纹，苔少甚至无苔，脉细数	滋阴清热	清骨散	知柏地黄丸
气郁发热证	发热多为低热或潮热，热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少。舌红，苔黄，脉弦数	疏肝理气，解郁泻热	丹栀逍遥散	丹栀逍遥丸
血瘀发热证	午后或夜晚发热，或自觉身体某些部位发热，口燥咽干，但不多饮，肢体或躯干有固定痛处或肿块，面色萎黄或晦暗。舌质青紫或有瘀点、瘀斑，脉弦或涩	活血化瘀	血府逐瘀汤	血府逐瘀口服液

### 最佳选择题

治疗内伤发热阴虚发热证可选用的中成药是

- A. 补中益气丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 杞菊地黄丸
- D. 六味地黄丸
- E. 附子理中丸

【答案】B

考点 56. 内科疾病-积聚

1. 疾病介绍: 积聚, 又称“癥瘕”, 是腹内结块, 或痛或胀的疾病。积属有形, 结块固定不移, 痛有定处, 病在血分, 是为脏病; 聚属无形, 包块聚散无常, 痛无定处, 病在气分, 是为腑病。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
肝气郁结证	腹中结块柔软, 时聚时散, 攻窜胀痛, 脘肋胀闷不适。舌淡红, 苔薄, 脉弦	疏肝解郁, 行气散结	逍遥散合木香顺气散	逍遥丸 木香顺气丸 宽胸舒气化滞丸
气滞血阻证	腹部积块质软不坚, 固定不移, 胀痛不适。舌苔薄, 脉弦	理气消积, 活血散瘀	柴胡疏肝散合失笑散	中华肝灵胶囊 肝脾康胶囊 阿魏化痞膏
瘀血内结证	腹部积块明显, 质地较硬, 固定不移, 隐痛或刺痛, 形体消瘦, 纳谷减少, 面色晦暗黧黑, 面颈胸臂或有血痣赤缕, 女子可见月事不下。舌质紫或有瘀斑瘀点, 脉细涩	祛瘀软坚, 佐以扶正健脾	膈下逐瘀汤合六君子汤	鳖甲煎丸 化癥回生片
正虚邪结证	久病体弱, 积块坚硬, 隐痛或剧痛, 饮食大减, 肌肉瘦削, 神倦乏力, 面色萎黄或黧黑, 甚则面肢浮肿。舌质淡紫, 或光剥无苔, 脉细数或弦细	补益气血, 活血化瘀	八珍汤合化积丸	和络舒肝胶囊 慢肝养阴胶囊

最佳选择题

某女, 53岁。久病体弱, 积块坚硬, 隐痛, 饮食大减, 肌肉瘦削, 神倦乏力, 面色黧黑, 面肢浮肿。舌质淡紫, 脉弦细。治宜选用的方剂是

- A. 补中益气汤加减
- B. 逍遥散合木香顺气散加减
- C. 丹栀逍遥散合失笑散加减

D. 膈下逐瘀汤加减

E. 八珍汤合化积丸加减

【答案】E

### 考点 57. 外科疾病-疔

1. 疾病介绍: 疔是指发生在肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
热毒蕴结证	好发于项后发际、背部、臀部。 轻者疔肿只有一两个,多则可散发全身,或簇集一处,或此愈彼起;伴发热,口渴,溲赤,便秘。舌苔黄,脉数	清热解毒	五味消毒饮合黄连解毒汤	连翘败毒丸 芩连片 清热暗疮片 龙珠软膏 如意金黄散
湿毒蕴结证	可发于全身任何部位,除发热等症状外,局部以红赤肿胀、灼热疼痛为主,随肿势渐增大,中央变软、波动,脓栓形成或破溃,疼痛加剧,伴有发热、口渴、便干、尿黄。舌苔黄或黄腻,脉滑数	清热利湿,解毒透脓	仙方活命饮合透脓散	皮肤病血毒丸 老鹤草软膏
阴虚内热证	疔肿常此愈彼起,不断发生。或散发全身各处,或固定一处,疔肿较大,易转变成有头疽;伴口干唇燥。舌质红,苔薄,脉细数	养阴清热 解毒	仙方活命饮合增液汤	知柏地黄丸

### 最佳选择题

某女,33岁,患有毛囊炎,皮肤红肿疼痛,溃后有少量脓液,治宜选用的中成药是

A. 连翘败毒丸

B. 芩连片

C. 如意金黄散

D. 老鹤草软膏

E. 知柏地黄丸

【答案】D

### 考点 58. 内科疾病-乳痈

1. 疾病介绍: 乳痈是发生在乳房部最常见的急性化脓性疾病, 其临床特点是乳房结块, 红肿热痛, 溃后脓出稠厚, 伴恶寒发热等全身症状。西医学的急性化脓性乳腺炎表现为上述症状者, 可参考此内容辨证论治。

## 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
气滞热壅证	乳汁郁积结块, 皮色不变或微红, 肿胀疼痛; 伴恶寒发热, 周身酸楚, 口渴, 便秘。舌苔薄, 脉数。	疏肝清胃, 通乳消肿	瓜蒌牛蒡汤	活血解毒丸 活血消炎丸
热毒炽盛证	乳房肿痛加剧, 皮肤焮红灼热, 继之肿块变软, 有应指感; 或溃后脓出不畅, 红肿热痛不消, 有“传囊”现象; 伴壮热不退, 口渴喜饮, 便秘溲赤。舌质红, 苔黄腻, 脉洪数。	清热解毒, 托里透脓。	五味消毒饮合透脓散	牛黄化毒片 九一散(九一散含轻粉, 不可久用, 不可内服)

### 最佳选择题

某女, 28岁。剖腹产1月余, 现症见乳汁淤积结块, 皮色微红, 肿胀疼痛, 伴恶寒发热, 周身酸楚, 口渴, 便秘, 舌苔薄, 脉数。宜选用的方剂是

- A. 五味消毒饮合透脓散加减
- B. 逍遥萎贝散加减
- C. 二仙汤合四物汤加减
- D. 枇杷清肺饮加减
- E. 瓜蒌牛蒡汤加减

【答案】E

### 考点 59. 外科疾病-粉刺

1. 疾病介绍: 粉刺是一种以颜面、胸、背等处见丘疹顶端如刺状, 可挤出白色碎米样粉汁为主要临床表现的皮肤病。西医学的痤疮、慢性毛囊炎、皮脂腺囊肿等疾病以上述表现为主者, 可参考此内容辨证论治。

## 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
肺经风	丘疹色红, 或有痒痛, 或有脓疱;	疏风清	枇杷清肺饮	化瘀祛斑胶囊

热证	伴口渴喜饮,大便秘结,小便短赤。舌质红,苔薄黄,脉弦滑。	肺		
胃肠湿热证	颜面、胸背皮肤油腻,皮疹红肿疼痛,或有脓疱;伴口臭,便秘,溲黄。舌质红,苔黄腻,脉滑数。	清热除湿解毒。	茵陈蒿汤	消痤丸、金花消痤丸、清热暗疮片
痰湿瘀滞证	皮疹颜色暗红,以结节、脓肿、囊肿、瘢痕为主,或见窦道,经久难愈;伴纳呆腹胀。舌质暗红或有瘀斑,苔黄腻,脉弦滑。	除湿化痰,活血散结	二陈汤合桃红四物汤	当归苦参丸

### 最佳选择题

皮疹颜色暗红,以囊肿为主,经久难愈;伴纳呆腹胀。舌质暗红,有瘀斑,苔黄腻,脉弦滑。治宜选用的方剂是

- A. 二陈汤合桃红四物汤
- B. 茵陈蒿汤
- C. 枇杷清肺饮
- D. 逍遥蒺贝散
- E. 二仙汤合四物汤

【答案】A

### 考点 60. 妇科疾病-月经先期

1. 疾病介绍: 月经周期提前 7 天以上,甚至 10 余日一行,连续两个周期以上者,称为“月经先期”。

#### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
脾气虚证	月经周期提前,经量多哦,色淡红,质清稀;神疲乏力,气短懒言,小腹空坠,纳少便溏。舌淡红,苔薄白,脉细弱	补脾益气,摄血调经	补中益气汤或归脾汤	人参归脾丸 当归丸
肾气虚证	月经周期提前,经量或多或少,色淡暗,质清稀;腰膝	补益肾气,固冲调经	固阴煎或归肾丸	女金丹丸

	酸软, 头晕耳鸣, 面色晦暗 或面有暗斑。舌淡暗, 苔白, 脉沉细			
肝郁血热 证	月经周期提前, 经量或多或 少, 经色深红或紫红, 质稠, 经行不畅, 或有块; 或少腹 胀痛, 或胸闷胁胀, 或乳房 胀痛, 或心烦易怒, 口苦咽 干。舌红, 苔薄黄, 脉弦数	疏肝清热, 凉血调经	丹栀逍遥散	丹栀逍遥丸

### 最佳选择题

肝郁血热证月经先期的首选方是

- A. 两地汤
- B. 清经散
- C. 清热固经汤
- D. 丹栀逍遥散
- E. 保阴煎

【答案】D

### 考点 61. 妇科疾病-月经后期

1. 疾病介绍: 月经后期以月经周期延后为特点。
2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
肾虚证	月经周期延后, 经量少, 色暗淡, 质清 稀, 或带下清稀; 腰膝酸软, 头晕耳鸣, 面色晦暗, 或面部暗斑。舌淡, 苔薄白, 脉沉细	补 肾 养 血调经	归肾丸	春血安胶囊 天紫红女金胶 囊
血虚证	月经周期延后, 经量少, 色淡红, 质清 稀, 或小腹绵绵作痛; 或头晕眼花, 心 悸少寐, 皮肤不润, 面色苍白或萎黄。 舌质淡红, 苔薄白, 脉细弱。	补 血 益 气调经	大补元煎	复方益母草膏

气滞证	月经周期延后,量少或正常,色暗红或有血块,小腹胀痛;或精神抑郁,胸胁乳房胀痛。舌质正常或红,苔薄白或微黄,脉弦或弦数	理气行滞调经	乌药汤	益母丸 得生丸 调经丸 调经活血片
痰湿证	月经周期延后,量少,色淡红,质黏稠;头晕体胖,心悸气短,脘闷恶心,口腻多痰,或带下量多黏腻。舌淡胖,苔白腻,脉滑	燥湿化痰,活血调经	芎归二陈汤	二陈丸

### 最佳选择题

月经后期之痰湿证见胸脘胀闷、恶心呕吐者,可选用的中成药是

- A. 益母丸
- B. 调经丸
- C. 得生丸
- D. 调经活血片
- E. 二陈丸

【答案】E

### 考点 62. 妇科疾病-痛经

1. 疾病介绍: 痛经是指女性正值经期或经行前后,以周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚则剧痛昏厥者为临床特征。

#### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
气滞血瘀证	经前或经期小腹胀痛,经血量少,行而不畅,经色紫暗有块,块下则痛减;乳房胀痛,胸闷不舒。舌质紫暗或有瘀点,脉弦	理气行滞,化瘀止痛	膈下逐瘀汤	调经丸 元胡止痛片 益母丸 舒尔经颗粒
寒凝血瘀证	经行小腹冷痛,得热则舒,经量少,色紫暗有块;形寒肢冷小便清长。脉细或沉紧	温经散寒,除湿,化瘀止痛	少腹逐瘀汤	温经丸 少腹逐瘀丸 妇科万应膏

湿热瘀阻证	经前或经期小腹灼热胀痛,拒按,经色暗红,质稠有块;平素带下量多色黄,或平时小腹痛,经来疼痛加剧,或伴经前低热,小便黄赤。舌紫红,苔黄而腻,脉滑数或涩	清热除湿,化瘀止痛	清热调血汤	当归芍药颗粒 潮安胶囊
气血虚弱证	经期或经后小腹隐痛喜按,或小腹空坠不适,月经量少,色淡,质清稀;面色无华,头晕心悸,神疲乏力。舌淡,脉细无力	益气养血,调经止痛	圣愈汤	妇女养血丸 参茸白凤丸 八宝坤顺丸
肝肾亏虚证	经期或经后小腹绵绵作痛,经行量少,色暗淡,质稀薄;腰膝酸软,头晕耳鸣;舌淡红,苔薄,脉沉细	益肾养肝,缓急止痛	调肝汤	安坤赞育丸 复方乌鸡口服液

### 多项选择题

痛经肝肾亏虚证常用的中成药有

- A. 安坤赞育丸
- B. 当归芍药颗粒
- C. 妇女养血丸
- D. 参茸白凤丸
- E. 复方乌鸡口服液

【答案】AE

### 考点 63. 妇科疾病-崩漏

1. 疾病介绍:崩漏是月经的周期、经期、经量发生严重失常的病证,经血非时暴下不止或不尽,前者谓之崩中,后者谓之漏下。

### 2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
气血两	出血量多或淋漓不尽,	补脾摄血,引血	归脾汤去当归、	定坤丹

虚证	血色淡薄，面色无华，气短懒言，食欲不振，便溏。舌质淡，苔薄白湿润，脉细弱	归经	茯神、远志加党参、茜草、乌贼骨、仙鹤草	乌鸡白凤丸 养血饮口服液
脾不统血证	出血量多，日久而止，气短神疲，面色㿔白，或面浮肢肿，手足不温，或饮食不佳，大便塘。舌质淡，苔薄白，脉弱或沉弱	健脾补气，养血调经	固本止崩汤加升麻、山药、大枣、乌贼骨。	人参归脾丸 阿胶三宝膏 山东阿胶膏
肝肾不足证	月经非时而下，或月经先期，经期延长，经血暗红，量少而淋漓不畅，咽干颧红，心烦潮热，腰膝酸软。舌红苔少或光剥苔，脉沉细无力	滋补肝肾，止血调经	左归丸合二至丸加黄芩、夏枯草、仙鹤草、制首乌	妇科止血灵片 安坤赞育丸 春血安胶囊
瘀血阻络证	经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，或停闭数月又突然崩中，继之漏下，经色暗有血块；舌质紫暗或尖边有瘀点，脉弦细或涩	活血化瘀，固冲止血	逐瘀止血汤或将军斩关汤	宫血停颗粒 四物胶囊 茜芷胶囊

最佳选择题

治疗血瘀崩漏的首选方是

- A. 逐瘀止血汤
- B. 桃红四物汤
- C. 失笑散
- D. 血府逐瘀汤

E. 少腹逐瘀汤

【答案】A

考点 64. 妇科疾病-带下过多

1. 疾病介绍: 带下过多是指带下量明显增多, 色、质、气味异常, 或伴有局部及全身症状者。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
脾虚湿盛证	带下量多, 色白或淡黄, 质稀薄, 或如涕如唾, 绵绵不断, 无臭; 面色㿗白或萎黄, 四肢倦怠, 脘肋不舒, 纳少便溏, 或四肢浮肿。舌淡胖, 苔白或腻, 脉细缓	健脾益气, 升阳除湿	完带汤	除湿白带丸 妇科白带膏
肾阳亏虚证	带下量多, 绵绵不断, 质清稀如水; 腰痛如折, 畏寒肢冷, 小腹冷感, 面色晦暗, 小便清长, 或夜尿多, 大便溏薄。舌质淡, 苔白润, 脉沉迟	温肾培元, 固涩止带	内补丸	金樱子膏 参茸卫生丸
湿热下注证	带下量多, 色黄或呈脓性, 质黏, 有臭气, 或带下色白质黏, 呈豆渣样, 外阴瘙痒, 小腹作痛, 口苦口腻, 胸闷纳呆, 小便短赤。舌红, 苔黄腻, 脉滑数	清热利湿, 解毒杀虫	止带方	妇炎净胶囊 妇炎康片 盆炎净颗粒 宫炎平片

最佳选择题

某女, 40岁。带下量多, 色白, 质稀薄, 无臭气, 四肢倦怠, 纳少便溏, 舌淡胖, 苔白腻, 脉细缓。中医应辨证为

- A. 肾阳亏虚证
- B. 脾虚湿盛证
- C. 湿热下注证
- D. 肝肾不足证

E. 阴虚火旺证

【答案】B

考点 65. 儿科疾病-积滞

1. 疾病介绍: 积滞以脘腹胀满、暖气酸腐、不思乳食、食而不化、大便溏薄或秘结酸臭为临床特征。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
乳食内积证	不思乳食, 嗳腐酸馊, 或呕吐食物、乳片, 脘腹胀满疼痛, 大便酸臭或便秘, 烦躁啼哭, 夜眠不安, 手足心热。舌质红, 苔白厚, 或黄厚腻, 脉弦滑, 或指纹紫滞	消乳化食, 和中导滞	乳剂用消乳丸; 食积用保和丸	保和丸 小儿消食片 小儿化食丸 大山楂丸 四磨汤口服液
脾虚夹积证	面色萎黄, 形体消瘦, 神疲肢倦, 不思乳食, 食则饱胀, 腹满喜按, 大便溏稀酸腥, 夹有乳片或不消化食物残渣。舌质淡, 苔白腻, 脉细滑, 或指纹淡滞	健脾助运, 消食化滞	健脾丸	健胃消食片 小儿胃宝丸

最佳选择题

积滞脾虚夹积证治疗宜选用的方剂是

- A. 养胃增液汤
- B. 异功散
- C. 不换金正气散
- D. 健脾丸
- E. 消乳丸

【答案】D

考点 66. 儿科疾病-厌食

1. 疾病介绍: 厌食以较长时间厌恶进食, 食量减少为临床特征。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
脾失健运证	食欲不振, 厌恶进食, 食而乏味, 或伴胸脘痞闷, 暖气泛恶, 偶尔多食则脘腹饱胀, 大便不调, 形体尚可, 精神如常。舌淡红, 苔薄白或薄腻, 脉尚有力	调和脾胃, 运脾开胃	不换金正气散	健儿消食口服液 复方消食茶
脾胃气虚证	不思进食, 食不知味, 神倦多汗, 大便溏薄夹不消化食物, 面色少华, 形体偏瘦, 肢倦乏力。舌淡, 苔薄白, 脉缓无力	健脾益气, 佐以助运	异功散	参苓白术散 启脾丸
脾胃阴虚证	不思进食, 食少饮多, 皮肤失润, 大便偏干, 小便短黄, 甚或烦躁少寐, 手足心热。舌红少津, 苔少或花剥, 脉细数。	滋脾养胃, 佐以助运	养胃增液汤	儿宝颗粒

最佳选择题

患儿, 3岁。体重 13kg, 自入幼儿园 2 个月来, 食欲不振, 面色少华, 偶尔多食后则脘腹饱胀, 恶心, 形体尚可, 精神如常, 二便不调, 舌苔薄腻。其治法是

- A. 消食导滞, 理气行滞
- B. 健脾益气, 开胃助运
- C. 滋脾养胃, 佐以助运
- D. 疏肝开郁, 理气助运
- E. 调和脾胃, 运脾开胃

【答案】E

考点 67. 五官科疾病-鼻渊

1. 疾病介绍: 鼻渊, 是以鼻流浊涕, 量多不止为主要特征的鼻病。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
风热蕴肺证	鼻塞，涕黄稠而量多，嗅觉差，鼻黏膜红肿，可伴头痛，发热，汗出，胸闷，咳嗽，痰多。舌红，苔黄，脉浮数	祛风清热宣窍	泻白散合辛夷清肺饮	利鼻片 鼻渊通窍颗粒 鼻渊片 鼻舒适片
胆经郁热证	脓涕量多，色黄或黄绿，或有臭味，鼻塞重，嗅觉差，鼻黏膜红赤。伴头痛较剧，口苦，咽干，目眩，耳鸣，耳聋，寐少梦多，烦躁易怒，小便黄赤。舌质红，舌苔黄或腻，脉弦数	清胆泄热通窍	龙胆泻肝汤	鼻渊舒胶囊 藿胆丸 胆香鼻炎片

最佳选择题

患者鼻塞，涕黄稠而量多，嗅觉差，鼻黏膜红肿，伴头痛，发热，汗出，胸闷。舌红苔黄，脉浮数。治疗可选用的中成药是

- A. 鼻舒适片
- B. 藿胆片
- C. 鼻渊舒胶囊
- D. 胆香鼻炎片
- E. 丹萸片

【答案】A

考点 68. 五官科疾病-耳鸣耳聋

1. 疾病介绍:

- (1) 耳鸣，是指患者自觉耳内鸣响，如闻蝉声，或如潮声；
- (2) 耳聋，是指不同程度的听觉减退，甚至消失。

2. 辨证论治

证候	症状	治法	方剂	中成药
风热侵袭	耳鸣或耳聋突然发生，如吹风音，昼夜不停，耳部胀闷不适，伴有发热恶寒，鼻塞流涕，	疏风清热，宣肺利窍	银翘散	银翘散

证	咽痒咳嗽。舌质红，苔薄黄，脉浮数			
肝火上扰证	耳鸣或耳聋突然发生，如闻潮声，多随情绪而波动，伴有头痛眩晕，面赤目赤，口苦咽干，烦躁，舌质红，苔黄，脉弦数	清肝泻火，开郁通窍	龙胆泻肝汤	龙胆泻肝丸 通窍耳聋丸 泻青丸
肾精亏损证	耳鸣或耳聋久发，耳鸣如蝉，昼夜不息，安静时尤甚，听力逐渐下降，伴有腰膝酸软，头晕目眩，或虚烦失眠，夜尿频多。舌淡红，少苔，脉细弱	补肾填精，滋耳复聪	耳聋左慈丸	耳聋左慈丸
脾胃虚弱证	耳鸣或耳聋日久，耳鸣声低，每遇疲劳加重，伴有倦怠乏力，头晕目眩，纳差便溏，或失眠健忘，面色无华。舌质淡，苔白，脉细弱或沉弱	健脾益气，聪耳通窍	益气聪明汤	补中益气丸

### 最佳选择题

肾精亏损型耳鸣耳聋可选用的方剂是

- A. 耳聋丸
- B. 银翘散
- C. 耳聋左慈丸
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 益气聪明汤

【答案】C

### 考点 69. 重点常用藏成药方剂

药物名称	功能
五味渣驯丸	清肝热，利胆退黄
五味麝香丸	清热解毒，凉血消肿
六味安消散	和胃健脾，消积导滞，活血止痛
七味红花殊胜丸	清热消炎，保肝退黄
八味沉香散	清心热，养心，安神，开窍
十味黑冰片丸	温胃消食，破积利胆
十一味金色丸	清热解毒，化瘀

萨热十三味鹏鸟丸	消炎止痛, 通经活络, 醒脑开窍
十三味菥蓂丸	清热, 通淋, 消炎止痛
二十五味松石丸	清热解毒, 疏肝利胆, 化痰
二十五味珊瑚丸	开窍, 通络, 止痛
二十五味鬼臼丸	祛风镇痛, 调经血
二十九味能消散	祛寒化痞, 消食, 调肝益肾
三十五味沉香丸	清瘟泻热, 宽胸益肺, 祛风通痹
七十味珍珠丸	安神, 镇静, 通经活络, 调和气血, 醒脑开窍
仁青常觉	清热解毒, 调和滋补
仁青芒觉	清热解毒, 益肝养胃, 明目醒神, 愈疮, 滋补强身
大月晶丸	消炎解毒, 和胃止酸, 消食化痞
洁白丸	健脾和胃, 止痛止呕, 分清泌浊
坐珠达西	疏肝, 健胃, 清热, 愈溃疡, 消肿
降脂丸	清血除脂
志嘎汗散	清热解毒, 消炎

### 最佳选择题

功能消炎解毒, 和胃止酸, 消食化痞的藏成药方剂是

- A. 仁青常觉
- B. 仁青芒觉
- C. 坐珠达西
- D. 洁白丸
- E. 大月晶丸

【答案】E

【解析】大月晶丸由寒水石、天竺黄、西红花、甘青青兰等 35 味药精制而成, 功能消炎解毒, 和胃止酸, 消食化痞。

### 考点 70. 蒙药的“服药十则”

“服药十则”是

- ①治疗寒证及驱虫药: 早晨空腹服。
- ②补养或下清“赫依”(通便、通经)药: 食前服。

- ③上行“赫依”（理气）药：食间服。
- ④司命“赫依”（镇静）药：食药交替服。
- ⑤平喘、祛痰或催吐药：不定期服。
- ⑥止逆药：与食混服。
- ⑦止噎或开胃药：夹食服（饭前饭后各一半）。
- ⑧治“巴达干”病或毒剧麻药及催眠药：睡前服。

**最佳选择题**

根据蒙医传统用药的“服药十则”，补养药的服用时间是

- A. 食间服
- B. 食前服
- C. 睡前服
- D. 空腹服
- E. 夹食服

【答案】B

**考点 71. 处方常用术语**

类别	举例
炮制类	酒蒸大黄、蜜炙麻黄、炒山药
修治类	远志去心，山茱萸去核，乌梢蛇去头、去鳞片
产地类	怀山药、田三七、东阿胶、杭白芍、广藿香、江枳壳、建泽泻
品质类	明天麻、子黄芩、左牡蛎、左秦艽、金毛狗脊、鹅枳实、马蹄决明、九孔石决明、净山楂
采时、新陈类	绵茵陈、陈香橼、陈佛手、陈皮、嫩桂枝、鲜芦根、鲜茅根、霜桑叶
颜色、气味类	紫丹参、香白芷、苦杏仁

**最佳选择题**

以下不属于与产地有关的中药术语的是

- A. 怀山药
- B. 田三七
- C. 广藿香
- D. 江枳壳

E. 净山楂

【答案】E

考点 72. 常见饮片的正名与别名

正名	别名	正名	别名
大血藤	红藤、血藤、活血藤	北沙参	辽沙参、东沙参、莱阳沙参
首乌藤	夜交藤	南沙参	泡沙参、空沙参、白沙参、白参
忍冬藤	金银藤、银花藤	金银花	忍冬花、双花、二花、银花
大黄	川军、生军、锦纹、将军	白果	银杏
山茱萸	山萸肉、杭山萸、枣皮	西红花	藏红花、番红花
千金子	续随子	红花	草红花、红蓝花
马钱子	番木鳖	肉苁蓉	淡大芸
牛蒡子	大力子、鼠黏子、牛子、恶实	决明子	草决明、马蹄决明
天冬	天门冬、明门冬	菟蔚子	益母草子、坤草子
海螵蛸	乌贼骨	益母草	坤草、菟蔚、益明
百部	野天门冬	牵牛子	黑丑、白丑、二丑、黑白丑
麦冬	麦门冬、杭寸冬、杭麦冬、寸冬	香加皮	北五加皮、杠柳皮
天花粉	栝楼根、瓜蒌根、花粉	重楼	七叶一枝花、蚤休、草河车
木蝴蝶	玉蝴蝶、千张纸、云故纸、白故纸	蛇蛻	龙衣
补骨脂	破故纸	淫羊藿	仙灵脾
丹参	紫丹参、赤参	槟榔	花槟榔、大肚子、海南子
拳参	紫参	罌粟壳	米壳、御米壳
甘草	皮草、国老	龙眼肉	桂圆肉、益智

最佳选择题

紫参的正名是

- A. 拳参
- B. 党参
- C. 北沙参
- D. 南沙参

E. 丹参

【答案】A

【解析】拳参的别名是紫参。

考点 73. 同类中药因病证不同而选择不同

四君子汤	病证较轻	选党参为君药
	病证较重	选人参为君药
同为表证	表实证	选麻黄为君药
	表虚证	选桂枝为君药
同为头痛	太阳头痛	用羌活
	阳明头痛	用白芷
	厥阴头痛	用藁本或吴茱萸
	鼻渊头痛	用辛夷或细辛

最佳选择题

同类中药因病证不同而选择不同。同样是头痛，那么鼻渊头痛用

- A. 独活
- B. 羌活
- C. 白芷
- D. 藁本
- E. 细辛

【答案】E

考点 74. 饮片处方药味的生品与制品

饮片	炮制品	应用实例
黄芪	炙黄芪	补中益气汤中用炙黄芪，可补气升阳
	生黄芪	玉屏风方中用生黄芪，可固表止汗
当归	酒当归	桃红四物汤活血行瘀，方中宜用酒当归
	生当归	当归补血汤补气生血，方中宜用生当归
大黄	生大黄	大承气汤泻下，方中宜用生大黄
	熟大黄	大黄廑虫丸破瘀消癥，方中宜用熟大黄
黄连	生黄连	泻心汤泻火解毒，方中宜用生黄连
	萸黄连	香连丸清热化湿，行气止痛，方中宜用萸黄连

知母	生知母	白虎汤用于外感热病，方中宜用生知母
	盐知母	大补阴丸、知柏地黄丸用于阴虚火旺，方中宜用盐知母
半夏	姜半夏（温中降逆）	姜半夏能温中降逆，香砂六君丸、温胆汤、小陷胸汤等方中宜用姜半夏
	法半夏（祛寒痰，调和脾胃）	小青龙汤治疗痰多咳喘，方中宜用法半夏

### 最佳选择题

某患儿，腹部胀满，疼痛拒按，大便秘结，烦躁不安，烦热口渴，手足心热，唇舌鲜红，舌苔黄燥，脉滑数或沉实，指纹紫滞。治疗宜选用大承气汤。方中大黄多用

- A. 生大黄
- B. 酒大黄
- C. 醋大黄
- D. 熟大黄
- E. 清宁片

【答案】A

### 考点 75. 饮片的配伍禁忌——“十八反”

十八反	
中药	所反中药
乌头（川乌、草乌、附子）	半夏、瓜蒌（全瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌仁、天花粉）、贝母（川贝母、浙贝母）、白蔹、白及
甘草	海藻、京大戟、甘遂、芫花
藜芦	南沙参、人参、苦参、丹参、玄参、细辛、芍药（赤芍、白芍）

### 最佳选择题

不宜与甘草同用的药物是

- A. 郁金
- B. 藜芦
- C. 甘遂
- D. 草乌
- E. 三棱

【答案】C

考点 76. 常见的处方应付实例

分类	重要考点
处方直接写药名（或炒）， 调配时给付清炒品的	（蔓荆、苍耳、牛蒡、白芥、紫苏、莱菔）子、谷芽、麦芽、 王不留行、酸枣仁
处方直接写药名（或炒）， 调配时给付麸炒品的	白术、僵蚕、枳壳
处方直接写药名（或制）， 调配时给付炮制品的	草乌（水制）、川乌（水制）、天南星（矾制）、附子（炮 制）、吴茱萸（甘草水制）、远志（甘草水制去心）、厚朴 （姜制）、何首乌
处方直接写药名（或炒或 炙），调配时给付烫制品的	龟甲、鳖甲、穿山甲
处方直接写药名（或煨）， 调配时给付煨制品的	花蕊石、钟乳石、自然铜、金礞石、青礞石、瓦楞子
处方直接写药名（或炒或 炭），调配时给付炭制品的	干漆、炮姜、地榆、侧柏叶、蒲黄
处方直接写药名（或炒或 炙），调配时给付蜜炙品的	枇杷叶、马兜铃
处方直接写药名（或炒或 炙），调配时给付醋炙品的	延胡索
处方直接写药名（或炒或 炙），调配时给付盐炙品的	补骨脂、益智仁

多项选择题

处方直接写药名（或炒），需调配清炒品的是

- A. 紫苏子
- B. 苍耳子
- C. 白芥子
- D. 吴茱萸
- E. 何首乌

【答案】ABC

考点 77. 中药特殊煎服法

煎煮方法	内容
先煎	(1) 矿物、动物骨甲类饮片: 蛤壳、紫石英、石决明、珍珠母、瓦楞子、鳖甲、龟甲、鹿角霜、磁石、牡蛎、生石膏、赭石、自然铜 (2) 有毒饮片: 生川乌、生草乌、制附子
后下	(1) 气味芳香类: 降香、沉香、薄荷、砂仁、白豆蔻、鱼腥草 (2) 久煎后有效成分易被破坏的饮片: 钩藤、苦杏仁、徐长卿、生大黄、番泻叶
包煎	(1) 含黏液质较多的饮片: 车前子、葶苈子 (2) 富含绒毛的饮片: 旋覆花、枇杷叶 (3) 花粉等微小饮片: 蒲黄、海金沙、蛤粉、六一散
烊化(溶化)	胶类中药, 如阿胶、鳖甲胶、鹿角胶、龟鹿二仙胶
另煎	贵重中药饮片, 如人参、西洋参、西红花、羚羊角
兑服	液体中药, 如黄酒、竹沥水、鲜藕汁、姜汁、梨汁、蜂蜜
冲服	贵细中药用量少, 宜先研成粉末再用群药的煎液冲服, 如雷丸、蕲蛇、羚羊角、三七、川贝、琥珀、鹿茸、紫河车、沉香、金钱白花蛇
煎汤代水	质地松泡、用量较大, 或泥土类不易滤净药渣的药物, 如葫芦壳、灶心土

最佳选择题

煎煮时需煎汤代水来服用的中药有

- A. 西红花
- B. 紫河车
- C. 葫芦壳
- D. 鹿角胶
- E. 川贝母

【答案】C

考点 78. 引起中药质量变异的环境因素

因素	具体内容
环境因素	温度
	温度过高或过低, 均有影响。在常温情况下, 储藏的中药一般都比较稳定

湿度	一般炮制品的绝对含水量应控制在 7%~13%，贮存环境的相对湿度应控制在 35%~75%
日光	日光照射，会使中药变色、气味散失、挥发、泛油、风化。但紫外线、热能能杀灭霉菌，起到散潮防霉的作用
空气	氧和臭氧（强氧化剂）均对中药变异起着重要的作用
霉菌	一般室温在 20℃~35℃，相对湿度在 75%以上，霉菌极易发育滋长，使得淡豆豉、瓜蒌、肉苁蓉等发生霉变、腐烂变质而失效
虫害	温度在 18~35℃，药材含水量达 13%以上及空气的相对湿度在 70%以上时，最利于常见害虫的繁殖生长
包装容器	在贮存中药时，要根据药品理化性质、贮存要求，选择适当的容器
贮存时间	药品不宜长时间贮存，要做到先产先出、近效期先出

### 最佳选择题

一般炮制品的绝对含水量应控制在

- A. 3~5%
- B. 7~13%
- C. 13~15%
- D. 3~9%
- E. 15~20%

【答案】B

考点 79. 《中国药典》“凡例”[贮藏]项下对各名词术语的规定

[贮藏]项下的规定，系对药品贮藏与保管的基本要求，除矿物药应置干燥洁净处不作具体规定外，一般以下列名词术语表示。

- (1) 遮光：系指用不透光的容器包装，例如棕色容器或黑色包装材料包裹的无色透明、半透明容器。
- (2) 密闭：系指将容器密闭，以防止尘土及异物进入。
- (3) 密封：系指将容器密封，以防止风化、吸潮、挥发或异物进入。
- (4) 熔封或严封：系指将容器熔封或用适宜的材料严封，以防止空气和水分的侵入并防止污染。
- (5) 阴凉处：系指不超过 20℃ 的环境。
- (6) 凉暗处：系指避光并不超过 20℃ 的环境。

(7) 冷处: 系指 2℃~10℃ 的环境。

(8) 常温: 系指 10℃~30℃ 的环境。

除另有规定外, [贮藏]项未规定贮存温度的一般系指常温。

### 最佳选择题

冷处所指环境条件

A. 不超过 20℃

B. 避光且不超过 20℃

C. 2~10℃

D. 10~30℃

E. 2~8℃

【答案】C

### 考点 80. 中药饮片的贮藏要求

药材和饮片	贮藏要求	具体的药物举例
含淀粉多	应贮于通风干燥处, 以防虫蛀	泽泻、山药、葛根
含挥发油多	应置阴凉、干燥处贮存, 防止走失香气或泛油	薄荷、当归、川芎、荆芥
含糖分及黏液质多	应贮于通风干燥处	肉苁蓉、熟地黄、天冬、党参
种子类药材	应密闭贮藏于缸、罐中	紫苏子、莱菔子、薏苡仁、扁豆
动物类药材	应密封保存, 并有通风设备, 阴凉贮存	皮、骨、甲、蛇虫躯体类药材
加酒、醋炮制的药品	应贮于密闭容器中, 置阴凉处贮存	酒当归、酒常山、酒大黄; 醋芫花、醋大戟、醋香附、醋甘遂
盐炙品	应贮于密闭容器内, 置通风干燥处贮存	泽泻、知母、车前子、巴戟天
蜜炙品	通常密闭贮于缸、罐内, 并置通风、干燥处, 以免吸潮	款冬花、甘草、枇杷叶
贵重饮片	人参、西洋参、麝香、熊胆、西红花、冬虫夏草等与一般饮片分开贮藏, 专人管理	
	麝香瓶装密闭	

	牛黄宜瓶装，在霉季时放入石灰缸中	
毒性中药	专人负责管理，切不可与一般饮片混贮	
易燃药物	必须按照消防管理要求存放于安全地点	硫黄、火硝

**最佳选择题**

炒至后的种子类饮片，应贮存于

- A. 通风干燥处
- B. 避光凉爽处
- C. 凉暗处
- D. 密闭容器中
- E. 阴暗处

【答案】D

**考点 81. 中成药剂型与贮藏要求（只列举重点内容）**

中成药剂型		贮藏要求
丸剂		密封
散剂		密闭
片剂		密封，置于室内凉爽、通风、干燥处
膏剂	煎膏剂	密封，置阴凉处贮存
	膏药	密闭，置阴凉处贮存
	软膏剂	遮光容器中密闭保存，置于阴凉、干燥处
合剂		密封，置阴凉处贮存
颗粒剂		密封，在干燥处贮存，防止受潮
胶囊剂		密封；贮存温度不宜超过 30℃；室内阴凉干燥处
糖浆剂		密封，置阴凉处贮存
注射剂	注射液	密封于中性硬质玻璃安瓿中，遮光，防冻结，防高热
	注射用无菌粉末	密封于西林瓶中，遮光
胶剂		密闭贮存，防止受潮；置于室内阴凉干燥处
酒剂		密封，置阴凉处贮存
露剂		密封，置阴凉处贮存

栓剂	30℃以下密闭贮存
酏剂	遮光容器内密封, 置阴凉处贮存
流浸膏剂与浸膏剂	遮光容器内密封; 流浸膏剂应置阴凉处贮存
凝胶剂	避光, 密闭贮存, 并应防冻
搽剂、洗剂、涂膜剂	密封贮存
眼用制剂	遮光密封, 置阴凉处贮存
气雾剂、喷雾剂	置凉暗处贮存, 并避免曝晒、受热、撞击

### 最佳选择题

除另有规定外, 贮存时需遮光, 防冻结, 防高热的剂型是

- A. 软膏剂
- B. 注射液
- C. 喷雾剂
- D. 胶囊剂
- E. 糖浆剂

【答案】B

### 考点 82. 传统养护技术-对抗贮存法

对抗贮存法	<p>采用两种或两种以上药物同贮, 相互克制起到防止虫蛀、霉变的养护方法。一般适用于数量不多的药物。如:</p> <p>牡丹皮与泽泻、山药同贮 (木屑山)</p> <p>蛤蚧与花椒、吴茱萸或荜澄茄同贮 (借花朱碧石)</p> <p>蕲蛇或白花蛇与花椒或大蒜瓣同贮 (大花蛇)</p> <p>土鳖虫与大蒜同贮 (大土鳖)</p> <p>人参与细辛同贮 (新人)</p> <p>冰片与灯心草同贮 (冰心)</p> <p>硼砂与绿豆同贮 (绿豆沙)</p> <p>藏红花与冬虫夏草同贮等。(花花草草)</p> <p>还可采用与具有特殊气味的物质密封同贮, 如山苍子油、花椒、樟脑、大蒜、白酒等, 有时也可达到良好的防蛀、防霉效果</p>
-------	---

### 最佳选择题

与蛤蚧对抗同贮的中药是

- A. 绿豆

- B. 细辛
- C. 花椒
- D. 冰片
- E. 丹皮

【答案】C

考点 83. 保证合理用药的主要措施

保证合理用药的主要措施	具体内容
努力研习中医学	每一个执业药师都要始终将学习中医药基本知识和研究中医药理论, 放在业务工作的首位
准确辨析患者的病证	对患者进行准确地辨病与辨证, 不仅是对每一个临床医师的要求, 也是对每一个执业药师的要求
参辨患者的身体状况	执业药师在建议临床用药时, 应详细辨析患者的体质、年龄、性别和生活习惯等, 将其作为选用药物及制定用药方案时的重要依据, 投以针对病情及患者具体情况的最佳药物, 确定合理给药剂量, 万不能疏忽大意
确认有无药物过敏史	了解患者以往有无药物过敏史, 以及遗传缺陷, 如酶的缺陷或异常等, 指导临床医师及患者谨慎选择使用药物, 特别是避开患者高度敏感的药物等, 以保证用药安全
选择质优的饮片	给患者使用的中药和中成药, 应是质量最佳、疗效最好的饮片
合理配伍	用药配伍组方合理可以起到协调药物偏性, 增强药物疗效, 降低药物毒性, 减少不良反应发生的作用
选择适宜的给药途径及剂型	口服有效则多采用口服给药方法 危重病人、急症病人宜用静注或静滴 皮肤及阴道疾病常用外治法, 也可口服给药 气管炎、哮喘病人等可用口服给药方法, 也可采用气雾剂吸入疗法 经口服给药能达到预期疗效的, 则不考虑注射, 以避免中药注射剂引起不良反应
正确掌握剂量及用法	治疗热性病, 要求患者在服药期间慎食辛辣、油炸等热性食物

	失眠患者睡前忌饮浓茶
	滋补药宜饭前空腹服
	对胃肠有刺激或欲使药力停留上焦较久的药宜在饭后服
	藿香正气胶囊在治疗呕吐时, 宜用生姜煎汤送下, 以增强止呕作用
制定合理的用药时间和疗程	疗程过短则难以收到预期疗效, 疗程过长则可能给患者带来新的伤害。这是因为有些中药或中成药所含的某些成分在人体内有蓄积作用, 一旦这些成分的蓄积量达到了人体的最大耐受量, 即可对人体造成伤害
严格遵守用药禁忌	中药用药禁忌, 每一个执业药师应当熟练掌握, 严格遵守
认真审方堵漏	一字一句地认真审核每一个处方, 若发现处方中有字迹潦草难辨, 要立即询问处方医师, 切勿主观臆断
详细嘱咐用药宜忌	耐心地叮嘱患者一定要按所嘱方法服用药物, 避免因使用不当而影响药物的疗效, 或引起不良反应
按患者的经济条件斟酌选药	尽可能使用价廉质优的中药, 不到非用不可时, 不使用价格昂贵的中药

### 多项选择题

保证合理用药的措施有

- A. 剂量用法正确
- B. 配伍用药得当
- C. 用药疗程合理
- D. 准确辨析病证
- E. 选择适宜剂型

【答案】ABCDE

### 考点 84. 中药配伍原则—七情配伍

七情配伍是中药配伍最基本的理论, 是中医遣药组方的基础。七情是单行、相使、相须、相畏、相杀、相恶、相反的合称, 用以说明中药配伍后药效, 毒性变化的关系。

联用效果	七情配伍	举例
增进疗效, 可充分利用的配伍	相须配伍	金银花配连翘, 可增强辛凉解表、疏散风热的作用
	相使配伍	枸杞子配菊花, 枸杞子补肾益精、补肝明目为主药, 菊花

		清肝泻火, 兼能益阴明目, 可增强枸杞子补肝明目的作用
削弱功效, 用药 需注意的配伍	相恶配伍	生姜可温胃止呕, 黄芩药性寒凉, 可削弱生姜的温胃作用, 即生姜恶黄芩
降低或者消除 毒性或副作用, 用药应避免	相畏配伍	半夏畏生姜, 生姜可以抑制半夏的毒副作用
	相杀配伍	生姜杀半夏, 生姜可以抑制半夏的毒副作用
产生毒性, 用药 时应严格同用	相反配伍	“十八反” “十九畏”
单行配伍		独参汤

### 最佳选择题

七情配伍是中药配伍最基本的理论, 是中医遣药组方的基础。金银花配连翘, 可

- A. 增强疗效
- B. 削弱功效
- C. 消除毒性
- D. 产生毒性
- E. 相反相成

【答案】A

### 考点 85. 中药饮片不同炮制品的正确应用

中药饮片	炮制品	炮制品功效	应用
当归	生当归	生当归质润, 长于补血调经, 润肠通便, 常用于血虚证、血虚便秘、痈疽疮疡等	当归四逆汤温经散寒, 养血通脉
	酒当归	酒当归善活血调经, 常用于血瘀经闭、 痛经, 风湿痹痛, 跌扑损伤等	四物汤补血调血, 调经 化瘀
	当归炭	当归炭以止血和血为主, 多用于崩中漏 下, 月经过多, 血虚出血	共人散剂止血和血
大黄	生大黄	大黄泻下力强, 故欲攻下者宜生用	温脾汤攻下冷积, 温补 脾阳
	熟大黄	熟大黄泻下力缓, 泻火解毒, 用于火毒 疮疡	大黄虻虫丸活血破瘀, 通经消癥

	酒大黄	酒大黄泻下力较弱, 善清上焦血分热毒, 宜用于目赤咽肿, 齿龈肿痛	当归龙荟丸泻火通便
	大黄炭	大黄炭凉血化瘀止血, 多用于血热有瘀出血证	十灰丸凉血止血
白芍	生白芍	生白芍擅长养血敛阴, 平抑肝阳	四物汤补血调血
	炒白芍	炒白芍性稍缓, 以养血和营, 敛阴止汗为主	痛泻要方补脾柔肝, 祛湿止泻
	酒白芍	酒白芍酸寒之性降低, 入血分, 善于调经止血, 柔肝止痛	柴胡舒肝丸疏肝理气, 消胀止痛
香附	生香附	生香附长于行气解郁, 调经止痛	越鞠丸行气解郁
	醋香附	醋炙香附偏于疏肝止痛, 并能消积化滞	越鞠保和丸疏肝解郁, 开胃消食

**最佳选择题**

当归四逆汤温经散寒, 养血通脉, 治疗血虚寒厥证。方中所用当归为

- A. 生当归
- B. 酒当归
- C. 土炒当归
- D. 盐当归
- E. 麸炒当归

【答案】A

**考点 86. 中成药之间的配伍应用**

配伍	配伍举例	作用
功效相似	附子理中丸+四神丸	增强温肾运脾、涩肠止泻的功效, 治疗脾肾阴虚之五更泄泻
	归脾丸+人参养荣丸	明显增强补益心脾、益气养血、安神止痉的功效, 治疗心悸失眠、眩晕健忘
	脑立清胶囊(片)+六味地黄丸	用于高血压病证属肝肾阴虚, 风阳上扰者
功效不同一药	二陈丸+平胃散	二陈丸燥湿化痰为主药, 辅以平胃散同

为主，一药为辅	乌鸡白凤丸+香砂六君丸	用，可明显增强二陈丸燥湿化痰之功 乌鸡白凤丸为主药，辅以香砂六君子丸，增强主药的养血调经之功
一种药物能够明显抑制或消除另一种中成药的偏性或副作用	舟车丸+四君子丸 金匮肾气丸+麦味地黄丸（生脉散/参蛤散）	峻下而不伤正气 用于肾虚作喘久病兼见咽干烦躁者，防止金匮肾气丸燥烈伤阴，降低副作用
部分疾病的治疗必须采用不同治疗方法	内服艾附暖宫丸，外贴十香暖脐膏	用于妇女宫冷不孕。共奏养血调经、暖宫散寒之效
	内服六神丸，外用冰硼散吹喉	用于咽喉肿痛，共奏清热解毒、消肿利咽之效

### 最佳选择题

属于中成药配伍应用，一药为主，一药为辅，辅药能提高主药的功效的是

- A. 更衣丸与内消瘰疬丸
- B. 二陈丸与平胃散
- C. 急支糖浆与珍菊降压片
- D. 银黄片与双黄连口服液
- E. 镇咳宁胶囊与心通口服液

【答案】B

### 考点 87. 中成药与药引的配伍应用

治疗病证以及选用中成药	送服药引
外感风寒或脾胃虚寒之呕吐泄泻	生姜、大枣煎汤送服
治风寒表实咳嗽的通宣理肺丸	姜煎汤送服
温中散寒的附子理中丸	
和中解表的藿香正气水	
治疗跌打损伤、风寒湿痹等证的三七粉、云南白药、三七伤药片、七厘散、大活络丸、再造丸、醒消丸、跌打丸、独活寄生丸、腰痛宁胶囊	白酒或者黄酒送服

治疗便秘的麻仁丸	蜂蜜冲水送服
素有胃肠道疾患的患者服用更衣丸、麻仁丸、消渴丸、四神丸	米汤送服（大米、小米均可）
治疗身体衰弱的补益类中成药如十全大补丸、人参养荣丸等	
滋阴补肾的六味地黄丸、大补阴丸	淡盐水送服
清热导滞的至宝锭	焦三仙煎汤送服
治疗风热感冒的银翘解毒丸	鲜芦根煎汤送服
治疗头痛的川芎茶调散	清茶送服

### 最佳选择题

某女，20岁。近日患风热感冒，于是服用银翘解毒丸。为增强药物疗效，服用时可使用药引。作为药师，可推荐其使用的药引和服用方法是

- A. 焦三仙煎汤送服
- B. 鲜芦根煎汤送服
- C. 清茶送服
- D. 米汤送服
- E. 姜汤送服

【答案】B

### 考点 88. 中西药联用的特点

联用特点	中药或中成药	宜联用或同服的西药	联用作用
协同增效	黄连、黄柏	四环素、呋喃唑酮（痢特灵）、磺胺甲基异噁唑	治疗痢疾、细菌性腹泻
	金银花	青霉素	增强对耐药性金黄色葡萄球菌的杀菌作用
	枳实	庆大霉素	枳实能松弛胆括约肌，有利于庆大霉素进入胆道，提高后者的抗感染作用
	丙谷胺	甘草、白芍、冰片	治疗消化性溃疡，并已制成复方丙谷胺（胃丙胺）
	甘草	氢化可的松	在抗炎、抗变态反应中起到协同作用
	茵陈蒿汤、大柴	西药利胆药	相互增强消炎利胆的作用

	胡汤		
	参苓白术散和补中益气方	西药三联或四联疗法	针对幽门螺杆菌的根除治疗, 具有协同作用
	小青龙汤	激素	治疗小儿轻中度急性哮喘有良好的协同作用, 用药无明显不良反应
	丹参注射液、黄芪注射液、川芎嗪注射液等	低分子右旋糖酐、能量合剂	提高心肌梗死的抢救成功率
	丹参注射液	间羟胺(阿拉明)、多巴胺等	能加强升压作用, 还能减少对升压药的依赖性
	生脉散、丹参注射液	莨菪碱	治疗病态窦房结综合征, 既可适度提高心率, 又能改善血液循环, 从而改善缺血缺氧的状况, 达到标本兼治的目的
	复方丹参注射液	门冬氨酸钾注射液	治疗慢性重度肝炎, 患者症状体征明显改善, 肝功能恢复速率提高, 治愈时间缩短, 提高了临床治愈率
降低毒副反应	艾迪注射液	顺铂	顺铂对于治疗恶性肿瘤有很好的临床疗效, 但其易造成肝肾损伤, 艾迪注射液可能通过抗氧化作用, 对肝肾均起保护作用。
	甘草	呋喃唑酮	治疗肾盂肾炎, 既可防止其胃肠道反应, 又可保留呋喃唑酮的杀菌作用
	氯氮平	石麦汤(生石膏、炒麦芽)	氯氮平治疗精神分裂症有明显疗效, 但最常见的不良反应之一是流涎。合用后, 流涎消失率升高
	海螵蛸和白及粉	抗肿瘤药氟尿嘧啶与环磷酰胺	抗肿瘤药氟尿嘧啶与环磷酰胺常产生呕吐、恶心等胃肠道反应。海螵蛸和白及粉既能止血消肿, 又能保护胃黏膜, 联用对治疗消化道肿瘤有较好疗效
	碳酸锂	白及、姜半夏、茯苓	减轻胃肠道反应

	苓等复方中药
减少剂量	盐酸可乐定+珍菊降压片: 有较好的降压及改善症状的作用。若以常用量每次 1 片, 每日 3 次计, 盐酸可乐定比单用剂量减少 60%
	地西洋+苓桂术甘汤: 地西洋有嗜睡等不良反应, 若与苓桂术甘汤合用, 地西洋用量只需常规用量的 1/3, 嗜睡等不良反应也因为并用中药而消除
	五酯胶囊+他克莫司: 五酯胶囊与他克莫司联合应用, 既能提高后者的血药浓度, 又能保肝降酶。他克莫司使用剂量降低, 其血药浓度仍在治疗窗范围内, 费用可降一半

### 多项选择题

具有协同增效作用的中西药联用药组有

- A. 甘草与呋喃唑酮联用治疗肾盂肾炎
- B. 黄连、黄柏与磺胺甲基异恶唑联用治疗痢疾
- C. 甘草与氢化可的松联用于抗炎
- D. 丹参注射液与间羟胺联用于升压
- E. 柴胡桂枝汤与苯妥英钠联用治疗癫痫

【答案】BCD

【解析】A 项: 两者联用降低毒副作用。甘草与呋喃唑酮合用治疗肾盂肾炎, 既可防止其胃肠道反应, 又可保留呋喃唑酮的杀菌作用。(降毒甘喃石麦平)。B 项: 两者联用协同增效。黄连、黄柏与四环素、呋喃唑酮(痢特灵)、磺胺甲基异噁唑, 治疗痢疾、细菌性腹泻有协同作用, 常使疗效成倍提高。(增效连柏四磺喃)。C 项: 两者联用协同增效。甘草与氢化可的松在抗炎、抗变态反应方面有协同作用, 因甘草甜素有糖皮质激素样作用, 并可抑制氢化可的松在体内的代谢灭活, 使其在血液中浓度升高。(甘草可松丹参羟)。D 项: 两者联用协同增效。丹参注射液与间羟胺(阿拉明)、多巴胺等升压药同用, 不但能加强升压作用, 还能减少对升压药的依赖性。(甘草可松丹参羟)。E 项: 两者联用降低西药的不良反应。柴胡桂枝汤等具有抗癫痫作用的中药复方与西药抗癫痫药联用, 可减少抗癫痫药的用量及肝损害、嗜睡等副作用。(“护垫”)

### 考点 89. 中西药联用影响药物排泄的情形

分类	中药	西药	相互作用
增加	碱性中药(红灵散、女金丹、	尿液酸化药物(诺氟沙星、	碱性药物在酸性

排泄	硼砂、痧气散、煅龙牡、乌贝散、陈香露白露片)	呋喃妥因、呋喃美辛、头孢类抗生素)	环境下解离增多, 排泄加快
	山楂制剂	红霉素(碱性环境下抗菌作用很强)	血液中 pH 降低, 红霉素分解, 失去了抗菌作用
	冰硼散(硼砂为碱性中药)	青霉素、磺胺类药物等酸性药	增加了青、磺的排泄, 降低抗菌作用
	含有机酸(山茱萸、川芎、女贞子、乌梅、山楂、陈皮、青皮、木瓜)	氢氧化铝、氢氧化钙、碳酸钙、枸橼酸镁、碳酸氢钠、氨茶碱、氨基糖苷类抗生素(年轻卡卡)	酸碱中和, 降低或失去疗效
减少排泄	酸性中药(山茱萸、川芎、女贞子、乌梅、山楂、陈皮、青皮、木瓜)	磺胺类等酸性药物	增加磺胺类药物的肾毒性
		大环内酯类等酸性药物	增加大环内酯类药物的肝毒性
		利福平、阿司匹林	使得利、阿的排泄减少, 加重肾脏毒副作用

### 最佳选择题

能减少药物排泄的中西药联用药组是

- A. 乌梅与阿司匹林
- B. 乌头散与头孢拉定
- C. 石膏和四环素
- D. 麻黄与呋喃唑酮
- E. 大黄与利福平

【答案】A

考点 90. 重点中西药合理联用的例举

中药	西药	联用效果
----	----	------

逍遥散或三黄泻心汤	催眠镇静药	提高对失眠症的疗效,又可逐渐摆脱对西药的依赖性
芍药甘草汤	解痉药	提高疗效
补中益气汤、葛根汤	抗胆碱酶药	治肌无力疗效较好
钩藤散、柴胡加龙骨牡蛎汤	抗高血压药甲基多巴、卡托普利	改善对老年高血压症的治疗作用
黄连解毒汤、大柴胡汤	抗动脉粥样硬化、降血脂剂	增强疗效
木防己汤、真武汤、越婢加术汤、分消汤	利尿药	增强利尿效果
枳实	庆大霉素	枳实能松弛胆道括约肌,有利于庆大霉素进入胆道,增强抗感染作用
小青龙汤、柴朴汤	氨茶碱、色甘酸钠	提高对支气管哮喘的疗效
麦门冬汤、滋阴降火汤	磷酸可待因	提高了对老年咳嗽的镇咳作用
甘草	氢化可的松	在抗炎抗变态反应时同用,有协同作用
延胡索	阿托品	制成注射液,止痛效果明显增加
洋金花	氯丙嗪、哌替啶	制成麻醉注射液,用于手术麻醉不但安全可靠,而且术后镇痛时间长
十全大补汤、补中益气汤、小柴胡汤	抗肿瘤药	可以提高疗效。其中的中药可以提高天然杀伤细胞活性的能力,还可能有造血及护肝作用
复方丹参滴丸	阿托伐他汀钙	显著降低 2 型糖尿病患者的血清学指标,改善内皮功能,延缓动脉粥样硬化的发展。

最佳选择题

氢化可的松在抗炎抗变态反应时同用,有协同作用的中药是

- A. 枳实
- B. 芍药
- C. 桂枝
- D. 甘草

E. 延胡索

【答案】D

### 考点 91. 糖尿病用药以及注意事项

一、含西药组分的降糖类中成药

消渴丸、消糖灵胶囊均含有格列本脲。

二、含格列本脲成分的中成药的使用注意事项

格列本脲可促进胰岛 B 细胞分泌胰岛素，抑制肝糖原分解和糖原异生，增加胰外组织对胰岛素的敏感性和糖的利用，可降低空腹血糖与餐后血糖。其常用量一般为 2.5mg/次，3 次/日。磺胺过敏、白细胞减少患者禁用，孕妇及哺乳期妇女不宜使用，肝肾功能不全、体虚高热、甲状腺功能亢进者慎用。服用过量易致低血糖。

#### 多项选择题

以下中成药品种中含有格列本脲成分的有

A. 冠通片

B. 新癬片

C. 消渴丸

D. 益康胶囊

E. 消糖灵胶囊

【答案】CE

### 考点 92. 含盐酸麻黄碱的中成药品种以及注意事项

一、含西药组分的止咳平喘化痰类的中成药

含有盐酸麻黄碱的中成药品种有：良园枇杷叶膏、痰咳请片、镇咳宁糖浆、安嗽糖浆、苏菲咳糖浆、舒肺糖浆、散痰宁糖浆、天一止咳糖浆、消咳宁片。

二、含盐酸麻黄碱成分的中成药的使用注意事项

麻黄碱虽然是中药麻黄中的一个主要成分，但是两者之间功效并非等同。盐酸麻黄碱有舒张支气管、加强心肌收缩力、增强心输出量的作用，并有较强的兴奋中枢神经作用，能收缩局部血管。对于前列腺肥大者可引起排尿困难，大剂量或长期应用可引起震颤、焦虑、失眠、头痛、心悸、心动过速等不良反应。故甲状腺功能亢进症、高血压病、动脉硬化、心绞痛患者应禁用含盐酸麻黄碱的中成药。

#### 多项选择题

盐酸麻黄碱有舒张支气管、加强心肌收缩力、增强心输出量的作用，并有较强的兴奋中

枢神经作用,能收缩局部血管。对于前列腺肥大者可引起排尿困难,大剂量或长期应用可引起震颤、焦虑、失眠、头痛、心悸、心动过速等不良反应。故甲状腺功能亢进症、高血压病、动脉硬化、心绞痛患者应禁用含盐酸麻黄碱的中成药。那么含有盐酸麻黄碱的中成药有

- A. 止咳宝片
- B. 痰咳请片
- C. 咳特灵片
- D. 镇咳宁糖浆
- E. 鼻炎通喷雾剂

【答案】BDE

### 考点 93. 珍菊降压片的总结

(1) 珍菊降压片中所含的西药成分有盐酸可乐定、氢氯噻嗪。降压成分是盐酸可乐定。

(2) 珍菊降压片与单用盐酸可乐定降压的优势是减少了剂量。

(3) 氢氯噻嗪的典型不良反应是低血钾。

(4) 含麻黄的中成药不宜与降压药,如珍菊降压片合用。麻黄中麻黄碱的化学结构与肾上腺素相似,能直接与肾上腺素受体结合,同时还能促使肾上腺素能神经末梢释放介质,从而使血管收缩、血压升高。

(5) 感冒清片(胶囊)、珍菊降压片、雷公藤制剂、维C银翘片、穿琥宁注射剂、双黄连注射剂、清开灵注射剂、莲必治注射液、含青木香的中药汤剂、冠心苏合丸、舒肝理气丸、二十五味松石丸、含广防己的中药汤剂、含朱砂莲的中药颗粒剂、感冒通(片剂)、龙胆泻肝丸等被报告有肾毒性风险。

(6) 不良反应表现:消化系统表现为肝功能异常、黄疸、胰腺炎等;精神神经系统表现为头晕、视物模糊、运动障碍、麻木;皮肤及附件损害表现为剥脱性皮炎、全身水疱疹伴瘙痒等;代谢和营养障碍表现为低钾血症、低氯血症、低钠血症;有肾功能异常、心前区疼痛、心律失常、白细胞减少等个例报告。

(7) 用药指导

①注意用药剂量:与含有盐酸可乐定、氢氯噻嗪和芦丁成分的药品联合使用时,应分别计算各药品中相同组分的用量,以避免药物过量。

②防止撤药反应:停用本品时应在2~4天缓慢减量,以避免本品组分盐酸可乐定的撤药反应;如果已与β受体阻滞剂合用,应先停用β受体阻滞剂,再停用本品,避免与β受体阻滞剂序贯给药。

最佳选择题

珍菊降压片中含有的西药降压成分是

- A. 吲哚美辛
- B. 罗格列酮
- C. 二甲双胍
- D. 瑞格列奈
- E. 盐酸可乐定

【答案】E

考点 94. 老年人的不宜联用的药组

麝香保心丸	地高辛	麝香保心丸中含蟾酥，化学结构与强心苷类似 地高辛为强心苷类药物 两者联用，诱发强心苷中毒
复方丹参片（滴丸）、银杏叶片等含黄酮	法莫替丁片	黄酮+法莫替丁=形成螯合物，影响疗效
培元通脑胶囊（含鹿茸）、益心通脉颗粒（含人参）、活血通脉片（含人参）等含甘草、鹿茸、人参	降糖药（二甲双胍、消渴丸、阿卡波糖、胰岛素）	甘草、鹿茸、人参具有糖皮质激素样作用，可促进糖原异生，升高血糖，与降糖药发生拮抗作用，导致降糖效果降低
甘草、鹿茸	阿司匹林	加重胃粘膜损伤

最佳选择题

老年人使用法莫替丁时，应避免联用

- A. 培元通脑胶囊
- B. 消栓胶囊
- C. 逐瘀通脉胶囊
- D. 银杏叶片
- E. 麝香保心丸

【答案】D

考点 95. 肾功能不全者用药基本原则和注意事项

- (1) 明确疾病诊断和治疗目标。
- (2) 忌用有肾毒性的药物。
- (3) 注意药物相互作用，避免产生新的肾损害。
- (4) 坚持少而精的用药原则。
- (5) 定期检查，及时调整治疗方案。

多项选择题

肾功能不全时，药物代谢和排泄会受到影响。对于同一药物、相同剂量，肾功能正常者使用可能是安全的，但对肾功能不全者则可能引起蓄积而加重肾脏损害。以下关于肾功能不全者用药基本原则和注意事项的叙述，说法正确的是

- A. 明确疾病诊断和治疗目标
- B. 忌用有肾毒性的药物
- C. 注意药物相互作用，避免产生新的损害
- D. 坚持少而精的用药原则
- E. 定期检查，及时调整治疗方案

【答案】ABCDE

考点 96. 引起肝损伤的中药及其主要化学物质

大分类	小分类	具体药物
植物类	生物碱类	千里光属(如千里光、菊三七等)、款冬属、蜂斗菜属、泽兰属，紫草科的紫草属、天芥菜属
	苷类	三七、商陆、黄药子
	毒蛋白类	苍耳子、蓖麻子、望江南子、相思豆
	多肽类	毒蕈伞
	萜与内酯类	川楝子、黄药子、艾叶 (川楝子是含萜类肝脏毒性中药中最典型的一类物质，能引起急性中毒性肝炎，出现转氨酶升高、黄疸、肝肿大)
	鞣质类	五倍子、石榴皮、诃子
动物类	蜈蚣、鱼胆、蟾酥、斑蝥、猪胆	
矿物类	含汞类：朱砂 (HgS)、银朱 (HgS)、红粉 (HgO)、轻粉 (Hg <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> )、白降丹	

	( $Hg_2Cl_2$ 和 $HgCl_2$ )
	含砷类: 砒石、雄黄、代赭石, 毒性成分主要是三氧化二砷 ( $As_2O_3$ )
	含铅类: 铅丹、密陀僧
可致肝损伤的常用中成药	复方青黛丸、壮骨关节丸、克银丸、雷公藤制剂、追风透骨丸、天麻丸、昆明山海棠片、腰痛宁胶囊、尪痹冲剂(片)、通络开痹片、复方雪莲胶囊、大活络丹、鼻炎康片、千柏鼻炎片、荷丹片、华佗再造丸、大活络丹
肝功能不全者禁用的中成药	仙灵骨葆胶囊、鼻渊片、活血壮筋丸、白蚀丸、伸筋活络丸、雷公藤片
肝功能不全者慎用的中成药	麝香通心滴丸、通痹胶囊、小儿肺热平胶囊、脑静片

### 最佳选择题

含有萜类成分, 能够引起能引起急性中毒性肝炎, 出现转氨酶升高、黄疸、肝肿大的药物是

- A. 苍耳子
- B. 川楝子
- C. 油桐子
- D. 望江南子
- E. 蓖麻子

【答案】B

### 考点 97. 中药药物不良反应/事件的发生机制

分类	发生机制	举例
副作用	一种药物具有多种功效, 治病时通常只利用其中一二种作用, 而其他的作用就会成为副作用	大黄逐瘀通经, 治疗瘀血肿痛, 其泻下攻积的功效就会导致腹泻的副作用
		麻黄宣肺平喘, 治疗哮喘, 麻黄碱升压, 因而就可能导致患者血压出现波动
毒性作用	用药剂量过大或时间过长引起	急性毒性, 如: 大量服用乌头、附子, 可即刻出现口舌及全身麻木、呕吐、头昏、神志不清、手足抽搐、

		<p>呼吸困难或衰竭, 心律失常、血压下降和中枢神经系统功能紊乱等症状</p> <p>慢性毒性, 如: 长期服用朱砂、雄黄等中药, 即可导致汞、砷等重金属蓄积中毒, 出现恶心、呕吐、腹痛腹泻等胃肠道症状及血尿、蛋白尿等肾损害</p>
变态反应	也称过敏反应, 本质上是一种病理性免疫反应	<p>五味子、白芍、当归、丹参等可引起荨麻疹</p> <p>虎杖、两面针等可引起药疹</p> <p>蟾酥、苍耳子、蓖麻子可引起剥脱性皮炎</p> <p>槐花、南沙参可引起丘状皮疹</p> <p>黄柏、天花粉、大黄等可引起湿疹样药疹</p> <p>清开灵注射液、双黄连注射液、参麦注射液、生脉注射液、香丹注射液、喜炎平注射液、丹参注射液、柴胡注射液等中药注射液可引起皮疹等过敏样反应、过敏性哮喘、过敏性休克</p>
后遗作用	停止用药后遗留下来的生物学效应	<p>服用小金丸、西黄丸等引起的皮肤红肿、瘙痒等过敏反应, 停药后即可逐渐消失</p> <p>服用熊胆粉、大黄、番泻叶、黄连等苦寒泻火药物后, 患者短期内出现的食欲减退等消化道不适症状</p> <p>长期大量服用甘草出现的假性醛固酮增多症</p>
特异质反应	少数患者服用某些药物后出现的一些与一般人群不同的反应, 与患者的特殊体质和先天遗传有关	<p>某些患者在遗传性葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷的情况下, 食用新鲜蚕豆后可突然发生急性血管内溶血</p>
药物依赖性	可分为精神依赖性和生理依赖性	<p>部分患者长期服用番泻叶可产生生理依赖性, 主要症状包括焦虑不安、全身疼痛、失眠、面热潮红、厌食、体温上升、呼吸频率加快、心率加快、呕吐、腹痛</p> <p>连续服用罂粟壳及含有罂粟壳的中成药易致成瘾</p>
致癌作用	发生机制与其含有的成分有关	<p>细辛、土槿皮、桂皮、八角茴香中含有黄樟醚和细辛醚等致癌物质</p>

		槟榔中含有槟榔碱和水解槟榔碱,也是一种致癌物质
		巴豆中含有的巴豆油就有明显的辅助致癌活性
致畸作用	某些药物可影响胚胎的正常生长发育,导致胎儿畸形	含砷和砷化合物的药物可致动物畸胎及增加死胎率
致突变作用	药物使某些器官在形态、功能上发生病变	雄黄、千里光等诱发雄性小鼠的微核率显著高于阴性对照,显示其具有潜在致突变作用

### 最佳选择题

临床利用大黄逐瘀通经的功效治疗瘀血肿痛,会导致腹泻的案例,属于

- A. 副作用
- B. 毒性作用
- C. 后遗作用
- D. 药物依赖性
- E. 变态反应

【答案】A

### 考点 98. 中药饮片的不良反应

具体品种	用量	主要不良反应
香加皮	3~6g	心律失常,如心率减慢、早搏、房室传导阻滞,严重者心肌纤颤而死亡
蓖麻子	2~5g	肝损伤:中毒性肝病
雷公藤	10~25g	急性肾功能衰竭
黄药子	5~15g	肝损害
吴茱萸	2~5g	流产
鸦胆子	0.5~2g	双肾刺痛;严重者可心律失常致死
白矾	0.6~1.5g	阿尔茨海默病;骨软化
胆矾	-	粪便多呈蓝绿色,口中有金属色涩味
蜈蚣	3~5g	妊娠禁用药,鼻黏性分泌物大量流出
细辛	1~3g	直接作用于中枢神经系统,最终可因呼吸中枢完全麻痹而死亡
苍耳子	3~10g	恶心,呕吐,腹痛、腹泻,重者可见黄疸、肝肿大、消

		化道出血
苦杏仁	5~10g	瞳孔散大, 呼吸麻痹而死亡
罂粟壳	3~6g	瞳孔极度缩小呈针尖样
何首乌	-	严重肝损伤

**最佳选择题**

罂粟壳中毒, 严重者主要表现为

- A. 出现各种出血症状, 严重脱水, 低蛋白血症
- B. 呼吸麻痹, 昏迷惊厥, 瞳孔散大, 对光反射消失
- C. 急性肾功能衰竭, 粒细胞减少, 再生障碍性贫血
- D. 呼吸表浅不规则, 面色苍白发绀, 瞳孔极度缩小呈针尖样
- E. 四肢麻木, 谵忘, 痉挛, 脑水肿, 意识障碍, 精神错乱

**【答案】D**

考点 99. 用药错误分级标准

分级	涵义
A 级	客观环境或条件可能引发差错
B 级	发生差错但未发给患者, 或已发给患者但未使用
C 级	患者已使用, 但未造成伤害
D 级	患者已使用, 需监测差错对患者造成的后果, 并根据后果判断是否需要采取措施预防和减少伤害
E 级	差错造成患者暂时性伤害, 需要采取处置措施
F 级	差错对患者的伤害可导致患者住院或延长住院时间
G 级	差错导致患者永久性伤害
H 级	差错导致患者生命垂危, 需要应用维持生命的措施
I 级	差错导致患者死亡

**最佳选择题**

用药错误分级标准中属 E 级的是

- A. 客观环境或条件可能引发差错 (差错隐患)
- B. 已发给患者但未使用
- C. 患者已使用, 但未造成伤害
- D. 差错造成患者暂时性伤害

E. 差错导致患者永久性伤害

【答案】D

考点 100. 医疗用毒性中药的中毒表现

医疗用毒性中药	中毒表现
乌头类药物	口舌、四肢及全身麻木、头痛、头晕、精神恍惚、语言不清或小便失禁，继而四肢抽搐、牙关紧闭、呼吸衰竭等（2016B）
马钱子类药	兴奋中枢神经系统，引起骨髓强直性痉挛；初期出现头晕、头痛、烦躁不安、面部肌肉紧张、吞咽困难；进而伸肌与屈肌同时做极度收缩
蟾酥类药物	洋地黄样作用，小剂量能使心肌收缩力增强，大剂量则使心脏停止于收缩期；胸闷、心律失常、脉缓慢无力、心电图显示房室传导阻滞等
雄黄类药物	口中有金属味、流涎、出血、氨酶升高、黄疸、血尿、蛋白尿等
朱砂、轻粉、红粉的药物	口中有金属味、流涎、口腔黏膜充血、牙龈肿胀溃烂

最佳选择题

过量服用含马钱子的中成药会引起

- A. 面部肌肉紧张，痉挛，角弓反张，惊厥
- B. 四肢抽搐，牙关紧闭，呼吸衰竭
- C. 大汗，头晕目眩，口唇黏膜糜烂，脱发
- D. 吐血，咯血，便血，尿血，黄疸
- E. 口腔黏膜充血，牙龈肿胀溃烂，少尿

【答案】A