

外科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 21 期

1. 急性乳腺炎的首发症状为

- A. 患侧腋窝淋巴结肿大
- B. 发热
- C. 搏动性疼痛
- D. 局部硬块
- E. 乳房肿胀疼痛

【正确答案】E

【答案解析】急性乳腺炎常以乳房肿胀疼痛为首发症状。

【医学教育网原创】

2. 乳房检查触诊顺序是

- A. 内上、内下、外下、外上、中央区
- B. 中央区、内上、内下、外下外上
- C. 外上、外下、内下、内上、中央区
- D. 内上、外上、外下、内下、中央区
- E. 中央区、内上、外上、外下、内下

【正确答案】C

【答案解析】正确的触诊手法是用指掌面循序对乳房外上（包括尾部）、外下、内下、内上、中央（乳头、乳晕）做全面检查，故答案 C 是正确的。

【医学教育网原创】

3. 加强腹股沟管前壁的疝修补方法是

- A. Bassini 法
- B. Halsted 法
- C. Ferguson 法
- D. McVay 法
- E. Shouldice 法

【正确答案】C

【答案解析】Ferguson 法在精索浅面将腹内斜肌下缘、腹横腱膜弓和联合腱缝合到腹股沟韧带以增强腹股沟管前壁，适用于腹横筋膜无显著缺损、腹股沟管后

壁尚健全的斜疝。

【医学教育网原创】

4. 腹部闭合损伤合并出血性休克时的处理原则是

- A. 立即手术探查
- B. 输血并给止血药
- C. 输血并给抗生素
- D. 积极抗休克，休克纠正后手术探查
- E. 积极抗休克的同时手术探查

【正确答案】E

【答案解析】内脏损伤的伤者很容易发生休克，故防治休克是治疗中的重要环节。已发生休克的内出血伤者要积极抢救，力争在收缩压回升至 12kPa 以上后进行手术，但若在积极的抗休克治疗下，仍未能纠正，提示腹内有进行性出血，则应当机立断，在抗休克的同时，迅速剖腹止血。

【医学教育网原创】

〔医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任〕