

医学教育网儿科主治医师：《答疑周刊》2022 年第 21 期

问题索引：

1. 胎位跟胎方位该怎么区别？

2. 右旋糖酐铁也是铁剂，也有口服的，为什么不能选择啊？

3. 宫缩乏力和胎盘残留的区别？

具体解答：

1. 胎位跟胎方位该怎么区别？

25 岁初孕妇，停经 18 周，不觉胎动。产科检查：宫底高度在脐耻之间，胎方位及胎心不清。监测宫内胎儿情况首选的方法是

- A. 腹部 X 线摄片
- B. 多普勒超声检查
- C. B 型超声检查
- D. 胎儿心电图检查
- E. 测定羊水甲胎蛋白值

【答案】C

【解析】胎方位的写法由三方面来表明：

- 1、代表骨在骨盆的左侧或右侧，简写为左（L）或右（R）；
 - 2、代表骨名称，如顶先露为“枕”，即“O”，臀先露为“骶”，即“S”，面先露为“颞”，即“M”，肩先露为“肩”，即“Sc”；[医学教育网原创]
 - 3、代表骨在骨盆之前、后或横。例如顶先露，枕骨在骨盆左侧，朝前，则胎位为左枕前（LOA），为最常见之胎位。
- 胎位就是头位、臀位这些简单的描述。

2. 右旋糖酐铁也是铁剂，也有口服的，为什么不能选择啊？

经产妇，27 岁，妊娠 32 周，进来自觉头晕、乏力及食欲较差。查体：皮肤黏膜苍白，有口腔炎，指甲薄，胎位、胎心及骨盆外测量均正常，血红蛋白 75g/L，血细胞比容 0.25。本例首选的药物应为

- A. 叶酸

B. 硫酸亚铁 [医学教育网原创]

C. 右旋糖酐铁

D. 少量多次输血

E. 维生素 B₁₂ 肌注

【答案】 B

【解析】 硫酸亚铁 0.3g 或琥珀酸亚铁 0.1g，每日 3 次，同时服维生素 C 0.1g 促进铁的吸收。[医学教育网原创] 补充铁剂，血红蛋白在 70g/L 以上者，口服为主。右旋糖酐铁一般为注射剂，适用于中重度缺铁性贫血，或者胃肠道反应严重不能口服铁剂、或者口服铁剂无效的患者。

3. 宫缩乏力和胎盘残留的区别？

经产妇，29 岁，39 周妊娠，G₃P₁A₁L₁，合并子痫前期，羊水过多。经阴胎盘娩出后，客观的估计阴道出血量约 1000ml。该患目前诊断为产后出血，最可能的原因为[医学教育网原创]

A. 宫缩乏力

B. 宫颈裂伤

C. 胎盘胎膜残留

D. 凝血功能障碍

E. 会阴裂伤

F. 以上都不是

【答案】 A

【解析】 宫缩乏力为最常见产后出血原因。[医学教育网原创]

胎盘残留出血量大，题目问最可能的原因，宫缩乏力为最可能的原因。