

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2022年第6期

问题索引:

1. 细菌性痢疾和阿米巴痢疾的鉴别要点是什么?
2. 劳风的主要症状是什么?
3. 乳癖的乳房肿块特点是什么?

具体解答:

1. 细菌性痢疾和阿米巴痢疾的鉴别要点是什么?

鉴别细菌性痢疾和阿米巴痢疾最可靠的依据是

- A. 潜伏期的长短
- B. 毒血症状的轻重
- C. 大便常规检查红白细胞计数
- D. 大便检出病原体
- E. 抗生素治疗是否有效

【答案】D

【解析】大便检出病原体是鉴别细菌性痢疾和阿米巴痢疾最可靠的依据[医学教育网原创]。

细菌性痢疾与阿米巴痢疾的鉴别

鉴别要点	阿米巴痢疾	急性细菌性痢疾
病原	阿米巴原虫	志贺菌
流行方式	散发	散发或流行或暴发
潜伏期	数周至数月	1~7日
全身症状	全身中毒症状轻或无, 多无发热	全身中毒症状重, 多有发热
腹痛	轻, 右下腹	重, 左下腹
腹泻	较轻	重
里急后重	不明显	明显

大便肉眼	暗红, 果酱样, 有腥臭味	黏液或脓血便
大便镜检	红细胞多于白细胞, 可见夏科-雷登结晶	大量白细胞、少量红细胞及吞噬细胞
大便培养	阿米巴滋养体或包囊	有志贺菌阳性
结肠镜检查	病变主要在结肠回盲部及升结肠, 见散发潜行溃疡, 周围红晕, 溃疡间肠黏膜正常	病变以乙状结肠及直肠为主, 肠黏膜弥漫性充血、水肿、浅表溃疡

## 2. 劳风的主要症状是什么?

《素问·评热病论》中, 劳风的主要症状不包括

- A. 恶风振寒
- B. 唾出若涕
- C. 咳出青黄痰块
- D. 呼吸喘促
- E. 强上冥视

**【答案】** D

**【解析】**原文: 劳风法在肺下, 其为病也, 使人强上冥视, 唾出若涕, 恶风而振寒, 此为劳风之病。帝曰: 治之奈何? 岐伯曰: 以救俯仰。巨阳引。精者三日, 中年者五日, 不精者七日。咳出青黄涕, 其状如脓, 大如弹丸, 从口中若鼻中出, 不出则伤肺, 伤肺则死也[医学教育网原创]。

(1) 劳风的病因病机: 劳风的病因为因劳而虚, 因虚而受风, 邪气化热壅肺; 病机为太阳受风, 卫阳郁遏, 肺失清肃, 痰热壅积。

(2) 劳风的症状: 劳风的主要症状为恶风振寒, 强上冥视, 唾出若涕, 甚则咳出青黄痰块。

(3) 劳风的治疗: 劳风的治疗宜利肺散邪以救俯仰, 排出痰液以通气道; 治则为针刺太阳以引经气。因势利导的排痰祛邪之法对于劳风的治疗至关重要[医学教育网原创]。

### 3. 乳癖的乳房肿块特点是什么?

关于乳癖肿块的特点, 不正确的是

- A. 可单侧发生
- B. 质地中等
- C. 多伴有压痛
- D. 与皮肤粘连
- E. 活动度好

**【答案】** D

**【解析】** 乳癖的乳房肿块可发生于单侧或双侧, 大多位于乳房的外上象限, 也可见于其他象限。肿块的质地中等或质硬不坚, 表面光滑或颗粒状, 活动度好, 大多伴有压痛。肿块的大小不一, 一般在 1~2cm 左右, 大者可超过 3cm[医学教育网原创]。