

医学教育网妇产科主治医师：《答疑周刊》2023 年第 10 期

淋病是由对柱状上皮及移行上皮黏膜有亲和力的、革兰阴性双球菌也称淋病奈瑟菌（NG，淋菌）引起的细菌性传播疾病（STD），主要表现为泌尿生殖系统的化脓性感染。以尿道炎和宫颈炎常见，患者多有排尿困难、尿频、尿急、尿痛及阴道排出黏液或脓性分泌物的典型症状。下面通过几道题，练习一下！

问题索引：

1. 未经治疗的淋病孕妇所分娩的新生儿应预防应用？
2. 对于妊娠合并淋病患者随访叙述不正确的是？
3. 淋病引起新生儿感染的叙述，下列不正确的是？

具体解答：

1. 未经治疗的淋病孕妇所分娩的新生儿应预防应用？

未经治疗的淋病孕妇所分娩的新生儿应预防应用

- A. 头孢曲松钠
- B. 多西环素
- C. 青霉素
- D. 四环素
- E. 大观霉素

【答案】A

【解析】淋病产妇分娩的新生儿，应尽快使用 0.5%红霉素眼膏预防淋菌性眼炎，并预防使用头孢曲松钠 25~50mg/kg（最大剂量不超过 125mg）单次肌肉注射或静脉注射。[医学教育网原创]

2. 对于妊娠合并淋病患者随访叙述不正确的是？

对于妊娠合并淋病患者随访叙述不正确的是

- A. 禁用喹诺酮类药
- B. 加强对患者的教育和性伴侣的诊治
- C. 持续性尿道炎、宫颈炎，应进行针对性检查
- D. 表现为阴道浆液性分泌物增多

E. 淋菌性眼炎患儿应住院治疗，并检查有无播散性感染

【答案】 D

【解析】 妊娠合并淋病主要有阴道脓性分泌物增多，外阴瘙痒或灼热，偶有下腹痛，妇科检查可见宫颈水肿、充血等宫颈炎表现。[医学教育网原创]

3. 淋病引起新生儿感染的叙述，下列不正确的是？

淋病引起新生儿感染的叙述，下列不正确的是

- A. 脑膜炎
- B. 肺炎
- C. 淋菌败血症
- D. 结膜炎
- E. 喉乳头状瘤

【答案】 E

【解析】 HPV 感染母亲所生新生儿可患喉乳头状瘤，不是淋病故选 E。[医学教育网原创]