

医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2024年第37期

问题索引：

1. 颞下颌关节的功能面是哪两个面？
2. 下牙槽神经阻滞麻醉口内法注射时，患者应该采取什么体位？
3. 响牙体缺损修复体粘结力大小的因素有哪些？
4. 固定矫治器的组成部分有哪些？

具体解答：

1. 颞下颌关节的功能面是哪两个面？

颞下颌关节的功能面是

- A. 关节结节前斜面和髁状突前斜面
- B. 关节结节后斜面和髁状突后斜面
- C. 关节结节后斜面和髁状突前斜面
- D. 关节结节前后斜面和髁状突横嵴
- E. 以上均不正确

【答案】C

【解析】颞下颌关节的功能区是髁突的前斜面和关节结节的后斜面，[医学教育网原创]而不是髁突顶部和关节窝顶部。

2. 下牙槽神经阻滞麻醉口内法注射时，患者应该采取什么体位？

口内注射法行下牙槽神经阻滞麻醉，病人应采取的体位是

- A. 病人大张口，下颌牙（牙合）面与地面平行
- B. 病人半张口，下颌牙（牙合）面与地面平行
- C. 病人大张口，下颌牙（牙合）面与地面呈  $45^\circ$
- D. 病人半张口，下颌牙（牙合）面与地面呈  $45^\circ$
- E. 病人半张口，下颌牙（牙合）面与地面呈  $30^\circ$

【答案】A

【解析】注射方法：病员大张口，下颌牙（牙合）平面与地面平行，将注射器放在对侧口角，即第一、第二前磨牙之间，与中线成  $45^\circ$  角。[医学教育网原

创]注射针应高于下颌（牙合）平面 1cm 并与之平行。

### 3. 响牙体缺损修复体粘结力大小的因素有哪些？

不影响牙体缺损修复体粘结力大小的是

- A. 预备体表面粗糙度
- B. 粘结剂的调合比例
- C. 粘结剂的种类
- D. 预备体的龈边缘形态
- E. 粘结剂的厚度

**【答案】** D

**【解析】** 牙体缺损修复体粘结力大小与预备体表面粗糙度、[医学教育网原创]粘结剂的调合比例、粘结剂的种类、粘结剂的厚度等因素有关。

### 4. 固定矫治器的组成部分有哪些？

下列哪项不是固定矫治器的组成部分

- A. 带环
- B. 矫治弓丝
- C. 托槽
- D. 末端弯
- E. 邻间钩

**【答案】** E

**【解析】** [医学教育网原创]邻间钩为可摘的矫治器的组成部分。